



Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H360FD : Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα.
Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύτησης.
H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αντανακλαστικής άσθνης.

Δηλώσεις Προφύλαξης:

P201: Εφοδιαστεί με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται.

P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμάσιες/άερια/σταγονίδια/ατμούς/ εκνεύρωματα.
P263: Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλενετε.

P310 : Καλέστε αρέσους το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. P337 + P313 : Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:
Συμβούλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβούλευμείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
P312 : Καλέστε αρέσους το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P405: Φυλάσσεται κλειδιάνεμο. P403 + P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμηνητικά κλειστός. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιεκτή σε... σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (βαθ προσδιοριστεί).

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΠΟΚΕΥΖΥΣΗ: Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευέμενό στη συσκευασία του. Αποθηκεύστε το σε ξήρο μέρος μακριά από παγωμά, υψηλές θερμοκρασίες και έντονα φως. Διατηρήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Υγρό Λίπασμα Βορίου

Seabor

Για αύξηση της καρποδετικής ικανότητας των φυτών,
διόρθωση τροφοπειών Βορίου και ενίσχυση
της ανάπτυξης σε όλες τις καλλιέργειες

Εμπλουτισμένο με
εκχύλισμα φυκιών
θαλάσσης

bio
Κατάλληλο
για βιολογικές
καλλιέργειες

ΣΥΝΘΕΣΗ

Βόριο 5,00 %
Εκχύλισμα φυκιών θαλάσσης 1,99 %

Αγωγιμότητα (ds/m): 17,32 Αλατότητα (ppt): 103 pH: 8,44

Ομάδα λιπασμάτων
νέου τύπου: ΣΤ'
Αρ. κυκλοφορίας: 24

Καθ. Περιεχόμενο

1 L

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ
HUMOFERT

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

Το Seabor είναι ένα υγρό δάλιμα Βορίου εμπλουτισμένο με εκχύλισμα φρέσκων φυτικών ουσιών όπως ελεύθερα αμινοξέα, υδατάνθρακες, βιταμίνες, φυσικές ορμόνες (κυτοκινίνες, αυξήνες, γιβερελλίνες κ.α.), καθώς και μακρο- και μικρο- θρεπτικά στοιχεία (μαγνήσιο, σιδήρο, μαγανίο, ψευδάργυρο, χαλκό κ.α.) τα οποία ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών και διεγείρουν όλες τις βιολογικές διεργασίες των φυτικών κυττάρων.

Το Seabor αποτελεί μια άριστη πηγή Βορίου για διαφυλλικές εφαρμογές κατάλληλη για όλες τις καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τροφοπειών Βορίου όπως:

- Μειωμένη καρποδετική ικανότητα
- Καθαρότερη πηγή ωριμασης
- Υποβαθμισμένη ποιότητα καρπού
- ΙΑΙΟΤΗΤΕΣ :** Το Seabor βοηθά πολύτελευτα στην ανάπτυξη των δέντρων και των φυτών ενώ παράλληλα βελτιώνει σημαντικά την καρποδετική τους ικανότητα. Τα αποτελέσματα που επιτυχήνονται από την εφαρμογή του Seabor είναι:
 - * Αυξημένα δεσμίματα ανθών και καρπών.
 - * Διόρθωση τροφοπειών Βορίου σε όλες τις καλλιέργειες.
 - * Επιτάχυνση της ωριμασης.
 - * Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε βιοτοκύς και αβιοτοκύς παράγοντες.
 - * Βελτιωμένη ποιότητα συγκομιδής.
 - * Αυξημένες αποδόσεις.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ : Το Seabor είναι ειδικά σχεδιασμένο για καλλιέργειες που εμφανίζουν καρποδετικά και άλλα προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη Βορίου. Εφαρμόζεται με διαφυλλικούς ψεκασμούς σύμφωνα με το ακολύθω πρόγραμμα εφαρμογών ανά καλλιέργεια:

Ελιά: Εφαρμόζετε 2-3 φορές (πριν την άνθηση, κατά τη διάρκεια της άνθησης και στο τέλος της άνθησης) με δοσολογία 0,75-1 L ανά 500L νερό.

Αχλαδία, Μηλιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά : Εφαρμόζετε 2-3 φορές (στο τέλος της άνθησης, μετά από κάθε κόψιμο και 2-3 εβδομάδες μετά τη δεύτερη εφαρμογή) με δοσολογία 0,5-0,75 L ανά 500 L νερό.

Μηδική, Τριφύλλι : Εφαρμόστε από τις αρχές της επαναλαμβάνοντας 10-15 μέρες μετά από κάθε κόψιμο με δοσολογία 0,75-1 L ανά 500 L νερό.

Αμπέλι : Εφαρμόστε στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης, πριν την άνθηση και κατά το σχηματισμό του τσαμπού με δοσολογία 0,75-1 L ανά 500 L νερό.

Φυλλώδη λαχανικά : Εφαρμόζετε 2-3 φορές από το στάδιο των πρώτων 4-5 πραγματικών φύλλων ως την αρχή σχηματισμού του κεφαλού με δοσολογία 0,5-0,75 L ανά 500 L νερό.

Κρητεπικά : Εφαρμόζετε 3-4 φορές αρχίζοντας 30 μέρες μετά τη μεταφύτευση, πριν την άνθηση και στην καρπόδεση με δοσολογία 0,5-0,75 L ανά 500 L νερό.

Τύρια : Εφαρμόζετε 1-2 φορές αρχίζοντας από το στάδιο των 5-6 πρώτων φύλλων και 10-15 μέρες αργότερα με δοσολογία 0,75-1 L ανά 250 L νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην εφαρμόζεται ποτέ πριν την εμφάνιση των 3 πρώτων πραγματικών φύλλων.

ΣΥΝΔΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Συνδύαζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα, καθώς και με υγρά και υδατοδιαλυτά λιπασμάτα. Το Seabor είναι προτιμότερα να προστίθεται πρώτο στη δεξαμενή. Σε κάθε περίπτωση ένα τεστ συνδυαστικότητας ενδικεύντα πάντα πριν την άναμιξη στη δεξαμενήν.

