


Το RIZOCYN περιέχει φυσικούς αναπτυξιακούς παράγοντες (κυτοκινίνες, αυξίνες, γιββερελίνες), αμινοξέα και πεπτίδια (προϊόντα υδρόλυσης), υδατάνθρακες, βιταμίνες (συμπεριλαμβανομένης της C και της Ριβοφλαβίνης-B2), ιχνοστοιχεία, χουμικά και φουλβικά οξέα.

Το RIZOCYN είναι απαραίτητο σε όλες τις πιο κάτω περιπτώσεις:

- Προώθηση της ρίζας σε όλους τους τύπους φυταρίων.
- Ξεπέρασμα του μεταφυτευτικού σοκ.
- Γρήγορη εδραίωση στο έδαφος όλων των μεταφυτευθέντων φυτών.
- Βελτίωση της φυτρωτικότητας των σπόρων και των βολβών.
- Ενίσχυση της ριζοβολίας των μοσχευμάτων.
- Βελτίωση της λειτουργίας του ριζικού συστήματος σε περιόδους έντονου στρες από ποικίλους παράγοντες όπως παγωνιά, ξηρασία κ.α.
- Αναπλήρωση της οργανική ουσίας του εδάφους.
- Καλύτερο αερισμό των ριζών.
- Αύξηση των κυτταροδιαιρέσεων της ρίζας.
- Πολλαπλασιασμό των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους οι οποίοι αυξάνουν τη βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος.

Παραγωγή - Διάθεση



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση, Τηλ. 210 284 5891,  
Fax. 210 281 7971 Web Site: [www.humofert.gr](http://www.humofert.gr) E-mail: [info@humofert.gr](mailto:info@humofert.gr)

## ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΡΙΖΑΣ



## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Φράουλα: Διαλύουμε 40ml (2 καπάκια) σε 10 λίτρα νερό και ποτίζουμε 20-40 φυτά. Εφαρμογή αμέσως μετά τη μεταφύτευση με το πρώτο πότισμα. Επαναλαμβάνουμε κάθε 2 εβδομάδες.

Καρπούζι, Πεπόνι, Φυλλώδη λαχανικά, Όσπρια, Αρωματικά φυτά: Διαλύουμε 20ml (1 καπάκι) σε 10 λίτρα νερό και ποτίζουμε 20-40 φυτά. Εφαρμογή κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση ή αμέσως μετά τη μεταφύτευση. Επαναλαμβάνουμε κάθε 2 εβδομάδες.

Εμβάπτιση ριζών και μοσχευμάτων: Μουσκεύουμε καλά τις ρίζες/μοσχεύματα για 3 λεπτά σε διάλυμα 40-60 ml (2-3 καπάκια) ανά 10 λίτρα νερό και φυτεύουμε.

Δέντρα, Αμπέλι, Καλλωπιστικά φυτά: Διαλύουμε 40ml (2 καπάκια) σε 10 λίτρα νερό και ποτίζουμε 2-4 δέντρα ανάλογα με το μέγεθός τους 2-3 φορές το χρόνο. Για νέες φυτεύσεις εφαρμόζουμε στην ίδια δοσολογία αμέσως μετά τη φύτευση. Σπορεία: 20-40 ml (1-2 καπάκια) ανά 10 lt νερό.

Φυτώρια: 20 ml (1 καπάκι) σε 10 lt νερό. Εφαρμόζουμε με το νερό του ποτίσματος. Επαναλαμβάνουμε κάθε 7-15 ημέρες.

Γκαζόν: 150-200 ml (7-10 καπάκια) ανά 100 m<sup>2</sup>. Επαναλαμβάνουμε κάθε 3-4 εβδομάδες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: Είναι συμβατό με όλα τα λυτάσματα και τεχνικά προϊόντα. Ένα τεστ συνδυαστικότητας συστήνεται πάντοτε πριν από κάθε ανάμεξη.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε συνθήκες δωματίου. Μετά τη χρήση μην αφήνετε το καπάκι ανοιχτό. Διατηρείστε το μακριά από παιδιά.