

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H360FD : Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

Δηλώσεις Προφύλαξης:

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται.

P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

P263 : Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P270 : Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P305 + P351 + P338 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310 : Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

P337 + P313 : Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

P312 : Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδυναμία.

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P403 + P233 : Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε... σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (θα προσδιοριστεί).

Περιέχει: Βορικό οξύ, Μονοαιθανολαμίνη

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

S-m-F

Υγρός Διεγέρτης Καρπόδεσης

ΝΡΚ 0-0-0+3B+1,6Mo

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% β/β)

Βόριο (B) 3,0

Μολυβδαίνιο (Mo) 1,6

Εκχύλισμα φυκιών 4,0

Περιέχει φυσικές φυτικές προωθητικές ουσίες (κυτοκινίνες και γιββερελλίνες)

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος (g/ml) 1,125

pH 8,0-8,1

Αγωγιμότητα (mS/cm) 34,1

Αλατότητα (ppt) 21,6

bio

Κατάλληλο για βιολογικές καλλιέργειες

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 (ΕΕ L 189) και 889/2008 (ΕΕ L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: ΣΤ'
Αρ. κυκλοφορίας: 24

Καθ. Περιεχόμενο

1 L

Παραγωγή - Διάθεση

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891, 210 285 5061 Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

Το **S-m-F** είναι ένας υγρός διεγέρτης ειδικά σχεδιασμένος να αυξάνει την καρποδετική ικανότητα των φυτών επεμβαίνοντας στις βιοχημικές διεργασίες που συντελούνται σε κυτταρικό επίπεδο εντός των φυτικών ιστών. Λόγω της σύνθεσής του προσλαμβάνεται εύκολα από τα φυτά και αρχίζει να δρα άμεσα στα κρίσιμα στάδια της ανθοφορίας και της καρπόδεσης.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **S-m-F** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε καλλιέργειες κηπευτικών προσφέροντας τα ακόλουθα οφέλη:

- * Βελτιώνει την ικανότητα καρπόδεσης.
- * Αυξάνει την ανθοφορία.
- * Αυξάνει την απορρόφηση του αζώτου από τα φυτά.
- * Διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών.
- * Προσφέρει υψηλές αποδόσεις στον παραγωγό.
- * Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται σε κηπευτικά, σπυροφόρα, αμπέλι, μηδική και ψυχανθή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το **S-m-F** είναι κατάλληλο για διαφυλλικούς ψεκασμούς και εφαρμογές από εδάφους μέσω του συστήματος λίπανσης-άρδευσης αν και είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται διαφυλλικά αν αυτό είναι εφικτό.

Διαφυλλική εφαρμογή

Αραιώνουμε σε κατάλληλη ποσότητα νερού σύμφωνα με τις ακόλουθες δοσολογίες και ψεκάζουμε.

Κολοκύθι, Πεπόνι: 150-250 ml/100 lt νερό. Εφαρμόζουμε επάνω στα άνθη όταν αυτά έχουν ανοίξει πλήρως.

Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά: 400-500 ml/ 100 lt νερό. Εφαρμόζουμε όταν 3-5 από τα άνθη της ταξιανθίας έχουν ανοίξει.

Φασόλι, Σόγια: 150-250 ml/100 lt νερό. Εφαρμόζουμε όταν 3-5 από τα άνθη έχουν ανοίξει.

Όπωροφόρα: 150-300 ml/100 lt νερό. Εφαρμόζουμε στην πλήρη άνθηση.

Εσπεριδοειδή: 150-300 ml/100 lt νερό. Εφαρμόζουμε στην πλήρη άνθηση.

Ελιά: 150-300 ml/100 lt νερό. Εφαρμόζουμε στην πλήρη άνθηση.

Αμπέλι: 150-250 ml/100 lt νερό. Εφαρμόζουμε στην πλήρη άνθηση.

Μηδική: 200-300 ml/100 lt νερό.

Εδαφική εφαρμογή

Γενικά εφαρμόζουμε σε δοσολογία 250-500 ml ανά στρέμμα όταν 3-5 από τα άνθη της ταξιανθίας έχουν ανοίξει πλήρως.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Συστήνεται να εφαρμόζεται τις απογευματινές ώρες όταν ο ήλιος έχει δύσει. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από στρες προκαλούμενο από υπερβολικές θερμοκρασίες, έντονους ανέμους κλπ. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να αποφεύγονται όταν υπάρχει ισχυρός άνεμος, επικείμενη βροχή και έντονος ήλιος.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα περισσότερα λιπάσματα και αγροχημικά προϊόντα. Να μην αναμινύεται με ορκατά έλαια και σκευάσματα που αντιδρούν με αλκαλικά διαλύματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των παρασκευαστών φυτοφαρμάκων πριν τα αναμίξετε με το **S-m-F**. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βύτιο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος μακριά από παγωνιά, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο φως. Διατηρήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

