

Act-1

ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ - ΑΝΟΞΩΟΓΟΝΗΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Δράση σε 2 επίπεδα ταυτόχρονα

Σε επίπεδο Φυτού

- * Ενδυναμώνει το ριζικό σύστημα.
- * Ενισχύει το ανοσοποιητικό / αμυντικό σύστημα των φυτών.
- * Βελτιώνει τις φυσιολογικές λειτουργίες όλων των τμημάτων του φυτού (ρίζα, βλαστός, φύλλωμα, άνθος, καρπός).
- * Προωθεί την πρόωμη ωρίμανση των καλλιεργειών.
- * Συμβάλλει στην αύξηση της καρπότητας.
- * Μειώνει την πτώση των ανθών και των καρπών.
- * Αυξάνει την απόδοση των καλλιεργειών.
- * Συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας της συγκομιδής (ομοίμορφοι και εύγεστοι καρποί, ομαλή ωρίμανση, μεγαλύτερη διάρκεια μετασυγκομιδής).

Σε επίπεδο εδάφους

- * Αναζωογονεί τα εξαντλημένα από τις συνεχείς καλλιέργειες εδάφη.
- * Βελτιώνει τη δομή και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους.
- * Αυξάνει τους πληθυσμούς των ωφέλιμων μικροοργανισμών που λειτουργούν ανταγωνιστικά ως προς την εγκατάσταση των παθογόνων - βλαβερών μικροοργανισμών του εδάφους.
- * Επιτρέπει τον καλύτερο αερισμό και τη μεγαλύτερη διεισδυτικότητα του ριζικού συστήματος.
- * Επαναφέρει τη βιολογική ισορροπία σε εδάφη που έχουν υποστεί απολύμανση.



ΡΙΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

χωρίς ACT-1



με ACT-1



ΣΥΝΘΕΣΗ

Μονοσακχαρίτες & Ολιγοσακχαρίτες	6.00 %
Πολυσακχαρίτες	1.50 %
Αμινοξέα, Πρωτεΐνες	15.20 %
Χουμικά οξέα	5.60 %
Ιχνοστοιχεία	0.05 %
Βιταμίνες (Φολικό οξύ, Νιασίνη, Ριβοβλαβίνη, Καροτίνη, Τοκοφερόλες, B12, C)	40 ppm



Act-1

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόζεται στο έδαφος μέσω του συστήματος άρδευσης - λίπανσης (υδρολίπανση) ή με ψεκάσμο γύρω από την περιοχή των ριζών στις ακόλουθες δοσολογίες :

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
Θερμοκηπίου : (Αγγούρι, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πεπόνι, Κολοκύθι)	1η Εφαρμογή : 7 - 10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση 2η Εφαρμογή : Κατά την καρπώδεση 3η Εφαρμογή : Κάθε 2 - 3 εβδομάδες	1 - 3 ml ανά φυτό
Υπαίθρια Κηπευτικά : (Τομάτα, Πιπεριά, Κολοκύθι, Μελιτζάνα, Καρπούζι, Πεπόνι)	1η Εφαρμογή : 7 - 10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση 2η Εφαρμογή : Κατά την καρπώδεση 3η Εφαρμογή : Κάθε 2 - 3 εβδομάδες	1 - 2 ml ανά φυτό
Λάχανο, Μαρούλι, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Αντίδι, Σπαράγγι	1η Εφαρμογή : μετά τη φύτευση 2η Εφαρμογή : 1 - 2 εβδομάδες μετά την πρώτη εφαρμογή	1 ml ανά φυτό
Φράουλα	1η Εφαρμογή : 1 εβδομάδα μετά τη μεταφύτευση 2η Εφαρμογή : Κατά το ξύπνημα της καλλιέργειας 3η Εφαρμογή : Μετά το δέσιμο	2 - 3 ml ανά φυτό
Πατάτα, Καρότο, Παντζάρι, Τεύτλα	1η Εφαρμογή : 7 - 10 ημέρες μετά τη φύτευση 2η Εφαρμογή : Κατά το δέσιμο του κονδύλου 3η Εφαρμογή : 10-15 ημέρες αργότερα	1 - 2 ml ανά φυτό
Μαϊντανός, Σέλινο, Άνηθος	Εφαρμογές: Κάθε 15 - 20 ημέρες	2 lt ανά στρέμμα
Καπνός	1η Εφαρμογή : Κατά τη φύτευση 2η Εφαρμογή : 20 - 30 ημέρες αργότερα	1 - 2 ml ανά φυτό
Βαμβάκι	1η Εφαρμογή : Μετά τα 4 πραγματικά φύλλα 2η Εφαρμογή : Μετά το δέσιμο του καρυδιού	1 ml ανά φυτό
Ρύζι	Εφαρμογές : Μετά την εμφάνιση του ρυζιού από το νερό	1,5 - 2 lt ανά στρέμμα
Καλλωπιστικά φυτά	Εφαρμογές : Κάθε 15 - 20 ημέρες	1 - 2 ml ανά φυτό
Θάμνοι	Εφαρμογές : Κάθε 15 - 20 ημέρες	3 - 4 ml ανά φυτό
Γκαζόν, Χλοοτάπητας	Εφαρμογές : Κάθε 15 - 20 ημέρες	500 ml ανά 100 τ.μ.
Αμπέλι	1η Εφαρμογή : Κατά την ανθοφορία 2η Εφαρμογή : Μετά την καρπώδεση	2,5 - 3 lt ανά στρέμμα
Εσπεριδοειδή, Ακτινίδιο	1η Εφαρμογή : Κατά την ανθοφορία 2η Εφαρμογή : Μετά την καρπώδεση	2,5 - 3 lt ανά στρέμμα
Μήλα, Αχλάδια, Σύκα	1η Εφαρμογή : Κατά την ανθοφορία 2η Εφαρμογή : Μετά την καρπώδεση	2,5 lt ανά στρέμμα
Βερίκοκα, Ροδάκινα, Κεράσια, Δαμάσκηνα, άλλα πυρηνόκαρπα	Εφαρμογές : Μετά την καρπώδεση	2,5 - 3 lt ανά στρέμμα

Αποκλειστική Διάθεση



Ερμού 1 και Θεοδοκοπούλου, 14452 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

