

# AMINA-SOIL

## 16 - 0 - 0

### ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

#### ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Άζωτο (N) .....	16,0 %
Οργανικό άζωτο ....	6,0 %
Αμμωνιακό άζωτο ..	10,0 %
Αμινοξέα .....	45,0 %

Φυσικοχημικές Ιδιότητες
pH (σε διάλυμα 10%) ..... 4,5-5
Αλατότητα (ppt) ..... 58,4
Αγωγιμότητα (mS/cm) ..... 86,8

Το AMINA-SOIL είναι ένα οργανικό λίπασμα πλήρως διαλυτό στο νερό που παρασκευάζεται από υδρόλυση φυσικών πρωτεΐνων φυτικής προέλευσης. Αυτή η παραγωγική διαδικασία εγγύαται τη διατήρηση των παραπίθετων αμινοξέων καθώς και ένα υψηλό ποσοστό αζώτου (>16%).

#### ΧΡΗΣΙΣ

Το AMINA-SOIL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες ως:

- Θ Οργανικό λίπασμα αζώτου.
- Θ Βιοδιέρπτης ανάκαμψης μετά από περιόδους έντουνο στρες από βιοτικούς και κλιματικούς παράγοντες λόγω του υψηλού ποσοστού αμινοξέων που περιέχει.
- Θ Διεγέρτης βελτίωσης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής.
- Θ Χηλικοποιητικός πάραγοντας ιχνοστοιχείων (Fe, Zn, Mn, Cu) καθώς τα αμινοξέα βελτιώνουν την απορρόφηση των μεταλλικών μικροστοιχείων.
- Θ Πηγή τροφής για τους ωφελίμους μικροοργανισμούς του εδάφους.

#### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αυξάνει την απόδοση και την ποιότητα παραγωγής των καλλιεργειών.
- Παρέχει άζωτο άμεσα διαθέσιμο στα φυτά.
- Ενισχύει την ανθεκτικότητα των φυτών στο στρες.
- Επιταχύνει τις βιοχημικές διεργασίες που συντελούνται μέσα στο φυτό (φωτοαύγνεση, σχηματισμός σακχάρων).
- Προσέρχεται στην ανάπτυξη των καρπών.

#### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα σχέδιον τα λιπάσματα και χημικά παρασκευάσματα. Όλες οι υδατοδιαλυτές σκόνες να αναμιγνύονται με το AMINA-SOIL μετά από προδιάλυση. Ακολούθηστα τις σδημίες των παρασκευαστών φυτοφαρμάκων πριν τα αναμίξετε με το AMINA-SOIL. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βυτίο.

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μετά την εφαρμογή πλύνετε καλά κάθε εκτεθειμένο μέρος του σώματος με άφθονο νερό. Χρησιμοποιείστε ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, φόρμα, γάντια κτλ.) κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

#### Καθ. βάρος

1 Kg  5 Kg  20 Kg

Αποκλειστική Διάθεση

**HUMOFERT** 

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση  
Τηλ. 210 284 5891 - Web Site: [www.humofert.gr](http://www.humofert.gr)

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το AMINA-SOIL μπορεί να εφαρμοστεί με πότισμα μέσω του συστήματος άρδευσης/λίπανσης καθώς και με διαφυλλικούς ψεκασμούς σύμφωνα με τις ακόλουθες δοσολογίες.

Υδρολίπανση: 0,5-1,5 kg/στρέμμα  
Διαφυλλική εφαρμογή: 50-100 g/100 L νερό

#### ΑΡΙΘΜΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Φράουλες: Κάθε 10-15 ημέρες από την έναρξη της ανάπτυξης έως τη συγκομιδή.

Καρποδεπτικά λαχανικά (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκύνθη, κ.α.): Κάθε 8-12 ημέρες από τη μεταφύτευση έως τα μέσα της συγκομιδής.

Φυλλοδότ λαχανικά: Κάθε 7-10 ημέρες αρχίζοντας από την εμφάνιση των πρώτων πραγματικών φύλλων.

Κηπυστικά (καρπούζη, πεπόνι, κ.α.): Κάθε 7-12 ημέρες ξεκινώντας μετά τη μεταφύτευση έως την πλήρη ανάπτυξη των καρπών.

Πατάτα: Κάθε 10-14 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο σχηματισμού του κονδύλου έως την έναρξη της άνθισης.

Καρότο, κρεμμύδι, παντζάρι: Κάθε 10-15 ημέρες ξεκινώντας από τη 2η-3η εβδομάδα μετά την ανάδην και έως τη μεγέθυνση της ρίζας.

Δέντρα (εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιές, κ.α.): Κάθε 10-15 ημέρες ξεκινώντας από το στάδιο πριν την ανθοφορία έως την αρχή της ωρίμανσης.

Ακτινίδιο: Κάθε 10-15 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο πριν την ανθοφορία έως την αρχή της ωρίμανσης.

Καλλιωπιστικά φυτά, Δασικά δενδρύλλια: Κάθε 10-12 ημέρες από τη μεταφύτευση και μετά.

Γκαζόν, αστικό πράσινο: Κάθε 10-15 ημέρες.

Δημητριακά: Στο στάδιο των 10-20 εκατοστών.

Χορτονομές: Κάθε 8-12 ημέρες αρχίζοντας νωρίς την άνοιξη και επαναλαμβάνοντας μετά από κάθε κομψίμωση.

Βαμβάκι: Στην αρχή της άνθισης και 7-12 ημέρες αργότερα.

Καλαμπόκι: Στο στάδιο των 15-20 εκατοστών, στο στάδιο των 25-35 εκατοστών και πιριν το σχηματισμό του θυσάνου.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Συστίνεται προδιάλυση του προϊόντος πριν την ανάμιξή του στη δεξαμενή εφαρμογής.

Εναλλακτικά προτείνεται η σταδιακή διάλυση του προϊόντος στο βυτίο με διαρκή ανάδευση για ευκολότερη μεταχείριση και αποφυγή συσσωμάτωσεων. Να εφαρμόζεται της δροσερές ώρες της ημέρας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: Β'  
Αρ. κυκλοφορίας: