

# 12 - 5 - 6

Αζωτο (N)	12,0 %
Ουρικό N	2,5 %
Αμμωνιακό N	7,6 %
Οργανικό N	1,9 %
Φώσφορος (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	5,0 %
Κάλιο (K <sub>2</sub> O)	6,0 %
Ασβέστιο (CaO)	6,0 %
Μαγνήσιο (MgO)	0,2 %
Θείο (SO <sub>3</sub> )	23,0 %
Οργανικός Άνθρακας (C)	18 %
Οργανική ουσία	35 %
Αμινοξέα & Πρωτεΐνες	13 %
Χουμικά & Φουλβικά οξέα	7 %
Υγρασία	7 %
C/N	1,5

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Όπωροφόρα δέντρα, Πυρηνόκαρπα, Μηλοειδή, Αμπέλι	50-70 kg/στρέμμα	Από τέλη Καλοκαιριού έως τέλη Άνοιξης
Εσπεριδοειδή	140-160 kg/στρέμμα	Χειμώνα
Ελιά	50-70 kg/στρέμμα	Φθινόπωρο-Χειμώνα
Κηπευτικά (υπαίθρια και θερμοκηπίου), Λαχανικά	60-100 kg/στρέμμα	Πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση
Καλαμπόκι, Καπνός, Ηλιανθος	40-50 kg/στρέμμα	Πριν τη σπορά
Δημητριακά, Σόγια, Ρύζι, Τεύτλα, Βάμβάκι	60-100 kg/στρέμμα	Πριν τη σπορά
Γκαζόν	80-100 kg/στρέμμα	Χειμώνα-Άνοιξη
Καλλωπιστικά	50-80 kg/στρέμμα	Φθινόπωρο-Άνοιξη

Αρ. Παρτίδας:  
Ημ. Παραγωγής:  
Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: Γ'  
Αρ. κυκλοφορίας: 23

**Συνθήκες Αποθήκευσης:** Πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένα δοχεία, σε θερμοκρασία δωματίου, σε ξηρό μέρος χωρίς υγρασία, προστατευμένο από βροχή, πάγο και υψηλές θερμοκρασίες.



Παράγεται στην Ιταλία  
από την Grena s.r.l  
(Approval Number :  
APB58UFERT2)