

4 - 11 - 5

		ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αζωτο (N)	4,0 %	Όπωροφόρα δέντρα, Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρτα, Μηλοειδή, Αμπέλι, Ελιά	50-60 kg/στρέμμα	Φθινόπωρο-Χειμώνα
Οργανικό N	4,0 %			
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	11,0 %			
Κάλιο (K ₂ O)	5,0 %			
Ασβέστιο (CaO)	18,0 %			
Μαγνήσιο (MgO)	0,3 %		40-50 kg/στρέμμα	Πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση
Θείο (SO ₃)	7,0 %			
Οργανικός Άνθρακας (C)	17 %		50-60 kg/στρέμμα	Φθινόπωρο-Χειμώνα
Οργανική ουσία	35 %			
Αμινοξέα & Πρωτεΐνες	18 %		50-60 kg/στρέμμα	Φθινόπωρο-Χειμώνα
Χουμικά & Φουλβικά οξέα	3 %			
Υγρασία	8 %		50-60 kg/στρέμμα	Πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση
C/N	4,3			

Οργανο-χημικό λίπασμα / απαγορεύεται η πρόσβαση εκτρεφόμενων ζώων στην έκταση τουλάχιστον για 21 ημέρες μετά τη διασπορά του στο έδαφος.

bio

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 (ΕΕ L189) και 889/2008 (ΕΕ L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν

Συνθήκες Αποθήκευσης: Πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένα δοχεία, σε θερμοκρασία δωματίου, σε ξηρό μέρος χωρίς υγρασία, προστατευμένο από βροχή, πάγο και υψηλές θερμοκρασίες.

Αρ. Παρτίδας:

Ημ. Παραγωγής:

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: Γ

Αρ. κυκλοφορίας: 23

Παράγεται στην Ιταλία από την Grena s.r.l
(Approval Number : APB58UFERT2)



5 212024 513335