

Χηλικό Ασβέστιο σε υδατοδιαλυτή κοκκώδη μορφή

Για τη διόρθωση της τροφοπενίας ασβεστίου σε όλες τις καλλιέργειες

Elem-Ca

Χηλικός παράγοντας
EDTA



Περιέχει
9,5% Ασβέστιο

Λίπασμα Ε.Κ.

Καθ. βάρος : 1 Kg
25 Kg

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου
Τ.Κ. 144 52, Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891
Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr
Web Site: www.humofert.gr

Το **Elem-Ca** περιέχει 9,5 % Ασβέστιο σε χηλική μορφή (χηλικός παράγοντας EDTA) και χρησιμοποιείται για τη διόρθωση της τροφοπενίας ασβεστίου σε όλες σχεδόν τις καλλιέργειες λαχανικών και δημητριακών. Δεν εφαρμόζεται διαφυλλικά σε καλλιέργειες σπυρικών.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δεν χρειάζεται προδιάλυση. Απλά προσθέτουμε τη συνιστώμενη ποσότητα σκόνης σε κατάλληλη ποσότητα νερού ώστε να εξασφαλίσουμε πλήρη κάλυψη της επιφάνειας που θέλουμε να ψεκάσουμε. Αναδεύουμε για λίγη ώρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πλήρη διάλυση, και ρυθμίζουμε τα ακροφύσια του ψεκαστήρα ώστε να ρίχνουν όσο το δυνατόν λεπτότερα σταγονίδια. Στη συνέχεια, ψεκάζουμε όλη την επιφάνεια του φύλλου και του βλαστού πολύ καλά. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να αποφεύγονται όταν υπάρχει ισχυρός άνεμος, επικείμενη βροχή και έντονος ήλιος. Συστήνεται οι εφαρμογές να γίνονται απογευματινές ώρες, όταν η ατμοσφαιρική υγρασία είναι ιδανική. Σε περίπτωση που βρέξει πριν περάσουν 4 ώρες από τον ψεκασμό, η καλλιέργεια θα πρέπει να ξαναψεκαστεί 3-4 μέρες αργότερα. Όταν χρησιμοποιείται μόνο του (χωρίς ανάμιξη με άλλα φυτοφάρμακα) συστήνεται η πρόσθεση προσκολλητικού στο διάλυμα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, οι διαφυλλικές εφαρμογές θα πρέπει να αρχίζουν στην αρχή της περιόδου, όταν υπάρχει αρκετό φύλλωμα για να απορροφήσει το σπρέι. Είναι πάντοτε προτιμότερο, να γίνονται πολλοί επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί με χαμηλή δόσολογία, παρά ένας με μεγαλύτερη δόσολογία. Να αποφεύγονται οι διαφυλλικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Σε περιπτώσεις έντονης έλλειψης ασβεστίου, οι εφαρμογές πρέπει να επαναλαμβάνονται σε διαστήματα 7-10 ημερών.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Γενικά για όλες τις καλλιέργειες

Εφαρμόζουμε διαφυλλικά 100 - 200 γρ./στρέμμα.

Παρατηρήσεις

1. Το **Elem-Ca** δεν πρέπει να εφαρμόζεται διαφυλλικά σε καλλιέργειες σπυρικών.
2. Οι δόσολογίες εξαρτώνται πάντα από το βαθμό της τροφοπενίας ασβεστίου, τον τύπο και το μέγεθος της καλλιέργειας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μπορεί να αναμιχθεί με όλα σχεδόν τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και παρασιτοκτόνα. Επίσης είναι συμβατό με τα υπόλοιπα ιχνοστοιχεία **Elem** καθώς και με διαλύματα που περιέχουν φώσφορο, όπως υγρά διαφυλλικά λιπάσματα. Ένα τεστ συνδυαστικότητας συστήνεται πάντα πριν την ανάμιξη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του.
- Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά την εφαρμογή.
- Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος, μακριά από έντονο φως.
- Να μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που υποφέρουν από στρες, όπως υπερβολικές θερμοκρασίες, έντονος ανέμος κλπ.
- Να αποφεύγεται η κατάποση και η επαφή με τα μάτια και το δέρμα.