

Το BORONiL είναι ένα υγρό λίπασμα πολύ αποτελεσματικό στην πρόληψη και θεραπεία τροφοπενιών βορίου. Το BORONiL περιέχει βόριο σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή τόσο από τα φύλλα όσο και από τις ριζές των φυτών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας :

H360FD : Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Δηλώσεις Προφύλαξης :

P201: Εφοδιάστετε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται. P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσει/αέρια/σταγονίδια/αιμολί/εκνευρίσματα. P264: Πλύνετε ... σχολαστικά μετά το χειρισμό. P263: Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P270 : Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P305 + P351 + P338 : ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. P310 : Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. P337 + P313 : Εάν δεν υπάρχει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P312 : Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P403 + P233 : Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε... σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (βα προοριότητας).

Περιέχει: Boric acid, 2-aminoethanol ethanolamine

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Υγρό Λίπασμα Βορίου

BORONiL

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% β/β)	(% β/ο)
Βόριο (B)	10,0 13,6

Προέρχεται από βορικό οξύ

- Θεραπεύει και προλαμβάνει τροφοπενίες βορίου
- Αυξάνει την καρποδετική ικανότητα των φυτών
- Κατάλληλο για διαφυλλικούς ψεκασμούς και υδρολιπάνσεις



Λίπασμα Ε.Κ.

Καθ. Περιεχόμενο

1 L

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το BORONiL συστήνεται για διαφυλλικούς ψεκασμούς και εφαρμογές από εδάφους μέσω όλων των συστημάτων λίπανσης-άρδευσης στις ακόλουθες δοσολογίες και περιόδους εφαρμογής:

Ελιά: Πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της άνθησης.
Διαφυλλικά: 250-1000 ml/500 lt νερό Υδρολίπανση: 1-2 lt/στρέμμα

Μηλιά: Στο τέλος της άνθησης και μετά την άνθηση.
Διαφυλλικά: 250-500 ml/500 lt νερό Υδρολίπανση: 1-2 lt/στρέμμα

Αχλαδιά, Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα: Στο τέλος της άνθησης και μετά την άνθηση. Διαφυλλικά: 500-1000 ml/500 lt νερό Υδρολίπανση: 1-2 lt/στρέμμα

Αμπέλι: Εφαρμόστε στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης, πριν την άνθηση και κατά το σχηματισμό του τσαμπιού.
Διαφυλλικά: 500-1000 ml/500 lt νερό Υδρολίπανση: 1-2 lt/στρέμμα

Ακρόδρυα: Πριν την άνθηση, κατά τη διάρκεια της άνθησης και στο τέλος της άνθησης. Διαφυλλικά: 125-750 ml/500 lt νερό Υδρολίπανση: 1-2 lt/στρέμμα

Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριά, Πεπόνι, Πατάτα, Παντζάρι, Καρότο: Εφαρμόστε 3-4 φορές αρχίζοντας 30 ημέρες μετά τη μεταφύτευση ή τη σπορά, πριν την άνθηση και στην καρπόδεση. Διαφυλλικά: 250-500 ml/250 lt νερό Υδρολίπανση: 1-2 lt/στρέμμα

Φασόλια, Μπιζέλια, Φακές: Εφαρμόστε 2-3 φορές αρχίζοντας 30 ημέρες μετά τη σπορά, πριν την άνθηση και στην καρπόδεση. Διαφυλλικά: 250-500 ml/250 lt νερό Υδρολίπανση: 1-2 lt/στρέμμα

Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Ξέλινο: Εφαρμόστε 2-3 φορές από το στάδιο των πρώτων 4-5 πραγματικών φύλλων ως την αρχή σχηματισμού του κεφαλιού.
Διαφυλλικά: 500-1000 ml/250 lt νερό Υδρολίπανση: 1-3 lt/στρέμμα

Τεύτλα: Εφαρμόστε 1-2 φορές αρχίζοντας από το στάδιο των 5-6 πρώτων φύλλων και 10-15 ημέρες αργότερα.
Διαφυλλικά: 500-1000 ml/στρέμμα Υδρολίπανση: 1-3 lt/στρέμμα

Τριφύλλι, Μηδική, Αλφάδα: Εφαρμόστε 1-2 φορές αρχίζοντας από τις αρχές της Άνοιξης. Διαφυλλικά: 500-750 ml/στρέμμα

Μεγάλες καλλιέργειες (Σταρά, Καλαμπόκι, Βαμβάκι, Ηλιοτρόπιο, Σόγια, Αραβίδα, Λυκίσκος, Λινάρι, κ.α.):

Διαφυλλικά: 250-500 ml/στρέμμα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Να μην εφαρμόζεται όταν το φως του ήλιου είναι έντονο και η θερμοκρασία μεγαλύτερη από 24°C. Να μην εφαρμόζεται ποτέ πριν την εμφάνιση των 3 πρώτων πραγματικών φύλλων. Η υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα (εγκαύματα ή βλάβη της καλλιέργειας). Να μην εφαρμόζεται από εδάφους σε περίπτωση άμεσης επαφής με σπόρους.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μπορεί να συνδυαστεί με τα περισσότερα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και μικροθρεπτικά στοιχεία. Όταν συνδυάζεται με φυτοφάρμακα, πρέπει να μπαίνει πρώτο στο βυτίο και σίγουρα πριν την πρόσθεση των φυτοφαρμάκων και των ρυθμιστικών παραγόντων. Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις ετικέτες των φυτοφαρμάκων πριν την ανάμιξη. Ένα τεστ συνδυαστικότητας ενδείκνυται πάντα πριν την ανάμιξη στη δεξαμενή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος μακριά από παγώνια, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο φως. Διατηρήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

