

ΤΟ FORCE είναι ένας υγρός συμπυκνωμένος ενεργοποιητής εδάφους με 18% χομψικά οξέα. Προέρχεται από επιλεγμένα κοιτάζομενα λεοντρόπιτα που έχουν από τη φύση τους υψηλή περιεπικόπητη χομψικών οξέων και είναι πλούσιο σε κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία (K, N, Ca, Mg, Fe, Mn κ.α.).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **FORCE** βελτιώνει τις ακόλουθες φυσικοχημικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους:

- Αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής καπιόντων (IAK).
- Βελτιώνει την ικανότητα συγκράτησης νερού.
- Ενισχύει την ικανότητα συγκράτησης ανόργανων θρεπτικών στοιχείων.
- Προώθει την απορρόφηση των απαραίτητων ανόργανων θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά.
- Διορθώνει το pH του εδάφους που μεταβάλλεται από τη συνεχή χρήση χημικών λιπαροσμάτων.
- Αποδεδειμένει τα εγκλωβισμένα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία λόγω υψηλής αγωγιμότητας του νερού αυξάνοντας τη διαθεσιμότητά τους στα φυτά.
- Μειώνει την απότολση των θρεπτικών στοιχείων.
- Διευκολύνει τη διεύδυση του αέρα στο εδάφος με αποτέλεσμα την καλύτερη οξυγόνωση του ριζικού συστήματος.
- Διεγέρει τη δράση του ωφέλιμου μικροβιακού πληθυσμού.

ΟΦΕΛΗ

Το **FORCE** αυξάνει την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων λιπαρισμάτων και παράλληλα μειώνει τις απώλειες θρεπτικών στοιχείων λόγω εξατμίσης και απότολσης. Ταπόρχων διεγέρει την ανάπτυξη του φυτού και προώθει τις βιολογικές διεργασίες που συντελούνται στα κύτταρα των ριζών ίδιατέρα κάτω από συνθήκες έντονου στρες (παγωνιά, θρασύτηα, αλατότητα) αποτέλεσμα την πιούστη της συγκομιδής προσδίδοντας στους καρπούς περισσότερα σάκχαρα και ιχνοστοιχεία καθώς και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο ραφι.

ΣΥΝΑΓΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν συνδυάζεται με ζήσινοικότανά επαφής και με ειδαιμόνια ή πολύ οξύα σκευάσματα. Συνδυάζεται με τα περισσότερα λιπαρισμάτα και μυρκοπτότα. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμηξη στη δεξαμενή. Αν κατά το τεστ εμφανίστει ίχνη αποφύγετε την ανάμιξη.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκνωμένο στη συσκευασία του. Προστατεύτε το από παγωνιά και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Πλυνετε καλά τα χέρια σας μετά την εφαρμογή. Είναι επιβαθμές εάν καταπίνεται. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε καλά το δέρμα και τα μάτια σας με άφθονο νερό. Άν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Υγρός Συμπυκνωμένος Ενεργοποιητής Εδάφους

FORCE



Πλούσιο σε οργανικά οξέα για ανάπλαση του εδάφους και δημιουργία πλεγματικού ιστού συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων κοντά στην ρίζα

Καθαρό Περιεχόμενο

1 lt 5 lt 10 lt 20 lt 200 lt

Αποκλειστική Διάθεση



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση, Τηλ. 210 284 5891
Fax: 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΤΩΡΙΟ-ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ

Φυτρωτόκοπτα σπόρων: Μούσκεμα των σπόρων πριν τη σπόρων και στη συνέχεια πότισμα των υποστρωματικών κύβων σε δοσολογία 30-40 ml ανά 10 λίτρα νερού.

Μεταχειρίσιτο σπόρων: 1-1,5 λίτρο ανά 100 κιλά σπόρου με ικανοποιητική ποσότητα νερού.

Ριζοβολία: 4 ml ανά 1 λίτρο νερού ριζοβολίας (μεταφυτευτικό νερό).

Ψεκασμός: Αναμιχτεί σε δοσολογία 1 λίτρο ανά 250-400 λίτρα νερού.

Εμβαπτίσιμη ριζών: Εμβαπτίστε τις ριζές για 5-10 λεπτά πριν την φύτευση σε διάλυμα αναλογίας 150 ml ανά 10 λίτρα νερού.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Διαφυλλικά: Εφαρμόζεται μία ή δύο φορές την εβδομάδα σε δοσολογία 75-150 ml ανά 100 λίτρα νερού.

Υδρολίπαση: Εφαρμόζεται μία ή δύο φορές την εβδομάδα σε δοσολογία 100-200 ml ανά 100 λίτρα νερού. Εναλλακτικά εφαρμόζεται σε αναλογία 0,5-1,5 λίτρο ανά στρέμμα 4 φορές κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας ανά διαστήματα 10-20 ημερών αρχίζοντας από τη φύτευση ή τη μεταφύτευση.

ΑΝΟΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Διαφυλλικά: Εφαρμόζεται μία ή δύο φορές την εβδομάδα σε δοσολογία 75-150 ml ανά 100 λίτρα νερού. Υπάρχει κίνδυνος της αφρίσης καφε κρίδης στα άνθη. Αν αυτό είναι ενοχλητικό, εφαρμόζεται το προϊόν μέσω υδρολίπασης.

Υδρολίπαση: Εφαρμόζεται μία ή δύο φορές την εβδομάδα σε δοσολογία 100-200 ml ανά 100 λίτρα νερού. Εναλλακτικά εφαρμόζεται σε αναλογία 0,5-1,5 λίτρο ανά στρέμμα 3-4 φορές κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας ανά διαστήματα 10-20 ημερών αρχίζοντας από τη φύτευση ή τη μεταφύτευση.

ΑΡΟΤΡΑΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ

Διαφυλλικά: Εφαρμόζεται σε δοσολογία 0,5-0,8 λίτρα ανά στρέμμα πριν την άνθηση και κατά την καρπόδεση.

ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΑ

Διαφυλλικά: Εφαρμόζεται σε δοσολογία 0,5-0,8 λίτρα ανά στρέμμα πριν την άνθηση, κατά την καρπόδεση και κατά την ωρίμανση. Η αναλογία αραίωσής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1:200.

Υδρολίπαση: Εφαρμόζεται σε δοσολογία 0,35-0,70 λίτρα ανά στρέμμα καθε 15 ημέρες κατά τη διάρκεια της καλλιέργεικης περιόδου.

ΧΛΟΟΤΑΠΗΣΕΣ, ΓΡΑΣΙΔΙΑ

Διαφυλλικά: Εφαρμόζεται σε δοσολογία 0,7-1,5 λίτρα ανά στρέμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Η αναλογία αραίωσής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1:200.

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ

Εφαρμόζεται σε δοσολογία 100-200 ml ανά 100 λίτρα θρεπτικού διαλύματος μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ