


AZOHUM

Φυτικός Θρεπτικός Ενεργοποιητής από Φυσική Οργανική Ουσία

ΣΥΝΟΕΣΗ

Οργανική ουσία (Χουμικά - Φουλβικά οξέα)	7.50 %
Κάλιο (K ₂ O)	0.84 %
Σίδηρος (Fe)	0.01 %



Αποκλειστική Διάθεση

HUMOFERT 

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52, Μεταμόρφωση, Τηλ. 210 284 5891
Fax. 210 281 7971 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- ◆ Αποδεσμεύει και ενεργοποιεί τη θρεπτικά στοιχεία του εδάφους.
- ◆ Αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής κατά διάντα μεταξύ ρίζας και εδάφους.
- ◆ Προσδίδει στο έδαφος σποργώδη υψηλή και βελτιώνει ταν αερισμό σε συνεκτικά φύρωμα.
- ◆ Μειώνει την έκπλυση των θρεπτικών στοιχείων και αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού σε όλους τους τύπους έδαφων.
- ◆ Διεγείρει την ανάπτυξη της φυσικής μικροχλωρίδας του εδάφους.
- ◆ Αυξάνει τη δράση των αποφυλλωτικών και των ζάχανικότων.
- ◆ Δημιουργεί πλούσιο ριζικό σύστημα και προσδίδει αντοχή στα φυτά.
- ◆ Μειώνει το μεταφευτικό στρες.
- ◆ Αυξάνει το μέγεθος και τον αριθμό των λουλουδιών και βελτιώνει το χρωματισμό τους.
- ◆ Δεν είναι φυτοτοξικό.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΕΝΤΡΑ-ΑΜΠΕΛΙΑ : Στην αρχή της βλάστησης, μετά την πώση των πετάλων και κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης έως 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΑΝΘΗ : Πριν τη φύτευση και κάθε 15-20 ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας. Εναλλακτικά εφαρμόζεται κάθε φορά που λιπαύνουμε για αύξηση της απόδοσης του λιπάσματος.

Καθαρό Περιεχόμενο

- | | |
|---------|--------------------------|
| 1 lt | <input type="checkbox"/> |
| 5 lt | <input type="checkbox"/> |
| 10 lt | <input type="checkbox"/> |
| 20 lt | <input type="checkbox"/> |
| 200 lt | <input type="checkbox"/> |
| 1000 lt | <input type="checkbox"/> |

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Υδρολίπαση: 2-5 λίτρα ανά στρέμμα σε συνδυασμό με λίπασμα (το AZOHUM μπαίνει τελευταίο στο διάλυμα).

Διαφυλλικά: 2 λίτρα ανά 1000 λίτρα νερό μαζί με λίπασμα, εντομοκτόνο ή ζάχανικότροφο.

Εμβάπτιση σπόρων: 2-4 λίτρα ανά 100 λίτρα νερό (αφήστε το σπόρο να στεγνωσει καλά).

Εμβάπτιση ριζών: Σε διάλυμα 2-4 λίτρα ανά 100 λίτρα νερό κατά τη μεταφύτευση.

Ριζοπότισμα μετά τη σπορά: 2 λίτρα ανά στρέμμα.

Οι δοσολογίες από εδάφους μπορούν να αυξηθούν σε πολύ φτωχά σε οργανική ουσία εδάφη και σε περιπτώσεις υπερβολικών αρδεύσεων που δέχεται μια καλλιέργεια.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα εντομοκτόνα, μικητοκτόνα και ζάχανικότροφα. Δεν συνδυάζεται με ζάχανικότροφα επαφής καθώς και με ελαιούχα ή πολύ άξια σκευαστήματα. Σε κάθε περίπτωση ένα τεστ συνδυαστικότητας συστίνεται πριν την ανάμεικη στη δεξαμενή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διατηρήστε το μακριά από παιδιά.

ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΙΡΙΝ
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ