

Το οργανικό φυσικό λίπασμα Acadian προέρχεται από φρέσκα θαλάσσια φυτά που συλλέγονται από τα παράκτια νερά του βόρειου Ατλαντικού ωκεανού στον Καναδά. Είναι μια φυσική αποθήκη κύριων και δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων σε χηλική μορφή, όπως Σίδηρο, Θείο, Μαγνήσιο, Ασβέστιο, Βόριο, Χαλκό, Ψευδάργυρο, Μολυβδαίνιο, Μαγγάνιο, Κοβάλτιο κ.α. Επίσης περιέχει τους υδατάνθρακες Μαννιτόλη, Αλγινικό οξύ και Λαμιναρίνη, φυσικούς παράγοντες προώθησης της ανάπτυξης των φυτών, όπως Κυτοκινίνες, Αυξίνες, Γιββερελλίνες και τα αμινοξέα Γλουταμινικό οξύ, Ασπαρτικό οξύ, Αργινίνη, Αλανίνη, Γλυκίνη, Λευκίνη, Λυσίνη, Βαλίνη, Σερίνη, Φαινυλαλανίνη, Ισολευκίνη, Ιστιδίνη, Προλίνη, Θρεονίνη, Τυροσίνη, Μεθιονίνη και Κυστίνη.

Όλο το παραπάνω ενεργειακό δυναμικό έρχεται να δώσει στα καλλιεργούμενα φυτά τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν και αριστοποιήσουν την παραγωγική τους ικανότητα.

- Βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά.
- Ενισχύει την ανάπτυξη δυνατού ριζικού συστήματος και κατ' επέκταση ολόκληρου του φυτού.
- Ευνοεί την ανθοφορία.
- Αυξάνει την καρποφορία.
- Αυξάνει την πρωτεϊνική περιεκτικότητα των καρπών καθώς και την περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία.
- Βελτιώνει την ποιότητα και τη γεύση των καρπών και των λαχανικών.
- Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών σε συνθήκες στρες από ποικίλους παράγοντες.
- Αυξάνει την αντοχή των καρπών στις μεταφορές.
- Διεγέρει και προωθεί το φύτρωμα των σπόρων.
- Βελτιώνει τις φυσικές και βιολογικές ιδιότητες του εδάφους, αυξάνοντας τη συνολική ιχνοστοιχειακή διαθεσιμότητα.
- Αυξάνει την αντοχή των φυτών στην παγωνιά, τη ξηρασία και το μεταφυτευτικό σοκ.
- Δεν είναι φυτοτοξικό.

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου : ΣΤ' Αριθμός κυκλοφορίας : 24



ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαφυλλική λίπανση: 25 - 50 γρ./100 λίτρα νερό.

Υδρολίπανση: 150 - 250 γρ./στρέμμα.

Σπορεία: 50 - 75 γρ./100 λίτρα νερό.

Εμβάπτιση σπόρων: 50 - 75 γρ./50 λίτρα νερό
(Αφήστε το σπόρο να στεγνώσει καλά).

Εμβάπτιση ριζών: Σε διάλυμα 50 - 75 γρ./50 λίτρα νερό κατά τη μεταφύτευση.

ΧΡΗΣΗ : Διαλύουμε πρώτα τη σκόνη σε λίγο νερό και ρίχνουμε το διάλυμα στη δεξαμενή εφαρμογής.

άλλη μια εφαρμογή στο μεταφυτευτικό νερό με αραίτερη δοσολογία.

Πατάτες : Πριν τη σπορά κάνουμε εμβάπτιση των κονδύλων για 24 ώρες. Μετά τη σπορά εφαρμόζουμε στο στάδιο δεσμίστας των κονδύλων, 10-14 ημέρες αργότερα και στην πρώιμη ανθοφορία.

Δέντρα : Στην αρχή της βλάστησης, μετά την πτώση των πετάλων και κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης έως 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

Αμπέλια : Εφαρμόζουμε πριν την ανθοφορία, στο 1ο στάδιο μεγέθυνσης του καρπού, στο 2ο και 3ο στάδιο μεγέθυνσης του καρπού και πριν την συγκομιδή.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδύαζεται με τα περισσότερα ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και προϊόντα διαφυλλικής λίπανσης. Δεν συνδύαζεται με ελαιούχα και πολύ όξινα σκευάσματα. Ένα τεστ συνδυαστικότητας συστήνεται πριν το ανακάτεμα στο βυτίο.

