

# Thio-S-Kal

## Υγρό Λίπασμα Θειοθειϊκού Καλίου 0 - 0 - 25 + 17S

Το **Thio-S-Kal** είναι ένα διαυγές υγρό λίπασμα Καλίου και Θείου το οποίο προέρχεται αποκλειστικά από Θειοθειϊκό Κάλιο και καλύπτει τις υψηλές ανάγκες καλίου που έχουν οι περισσότερες καλλιέργειες κατά τις περιόδους γρήγορης ανάπτυξης και μεγέθυνσης του καρπού.

Το Κάλιο είναι βασικό στοιχείο θρέψης των φυτών που ελέγχει τη λειτουργία των στομάτων του φύλλου, συμβάλλει στις κυτταροδιαιρέσεις, κανονίζει τη διόγκωση των κυττάρων και εμπλέκεται στο σχηματισμό των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των λιπών.

Από την άλλη πλευρά το Θείο είναι απαραίτητο για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και ποιότητας συγκομιδής στα περισσότερα είδη καλλιέργειών.

Το **Thio-S-Kal** προσφέρει έναν ιδανικό συνδυασμό Καλίου-Θείου σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή που συντελεί στη δημιουργία πολύ παραγωγικών φυτών με υψηλές αποδόσεις και άριστη ποιότητα συγκομιδής.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Άριστη, εύκολη στη χρήση και οικονομική πηγή Καλίου.
- Αυξάνει την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών.
- Βελτιώνει το χρώμα των καρπών.
- Ξεμπλοκάρει τα δεσμευμένα ιχνοστοιχεία του εδάφους.
- Βελτιώνει την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών στο στρες.
- Δεν περιέχει χλώριο.



### ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

**Πριν τη σπορά:** Εφαρμόστε σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm κάτω ή δίπλα από τη θέση εγκατάστασης για αποφυγή σοκαρίσματος του σπόρου σε δοσολογία 1-4 lt ανά στρέμμα αραιωμένο σε αναλογία 1:10-50.

**Μετά τη φύτευση:** Εφαρμόστε στην επιφάνεια του εδάφους ή μέσα στο έδαφος με έγχυση σε δοσολογία 1-20 lt ανά στρέμμα αραιωμένο σε αναλογία 1:10-50.

### ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ - ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Νεαρά Δένδρα	Υδρολίπανση: Με <b>στάγδην άρδευση</b> Κατά την έντονη ανάπτυξη των ριζών σε δοσολογία 3-10 lt/στρ Με <b>καταιονισμό, κατάκλιση ή αυλάκι</b> κάθε 10-15 ημέρες ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας σε δοσολογία 5 lt/στρ Διαφυλλικά: Στην έκπτυξη των πρώτων φύλλων και στη συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας σε δοσολογία 0,5 lt/400 lt νερό
Παραγωγικά Δένδρα	Υδρολίπανση: Με <b>στάγδην άρδευση</b> 1-2 φορές κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των ριζών σε δοσολογία 5-15 lt/στρ Με <b>καταιονισμό, κατάκλιση ή αυλάκι</b> κάθε 10-15 ημέρες ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας σε δοσολογία 10-15 lt/στρ Διαφυλλικά: Στην έκπτυξη των πρώτων φύλλων και στη συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας σε δοσολογία 1,0-1,5 lt/400 lt νερό
Νεαρά Αμπέλια	Υδρολίπανση: Με <b>στάγδην άρδευση</b> Κατά την έντονη ανάπτυξη των ριζών σε δοσολογία 3-10 lt/στρ Με <b>καταιονισμό, κατάκλιση ή αυλάκι</b> κάθε 10-15 ημέρες ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας σε δοσολογία 3 lt/στρ Διαφυλλικά: Αρχικά 15 ημέρες μετά την ανθοφορία και επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες σε δοσολογία 0,5 lt/200 lt νερό
Παραγωγικά Αμπέλια	Υδρολίπανση: Με <b>στάγδην άρδευση</b> 1-2 φορές κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των ριζών σε δοσολογία 5-10 lt/στρ Με <b>καταιονισμό, κατάκλιση ή αυλάκι</b> κάθε 10-15 ημέρες ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας σε δοσολογία 4-5 lt/στρ Διαφυλλικά: Αρχικά 15 ημέρες μετά την ανθοφορία και επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες σε δοσολογία 1,0 lt/200 lt νερό
Λαχανικά και άλλες γραμμικές καλλιέργειες	Υδρολίπανση: Με <b>στάγδην άρδευση</b> 2-4 φορές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου σε δοσολογία 3-5 lt/στρ Με <b>καταιονισμό, κατάκλιση ή αυλάκι</b> κάθε 10-15 ημέρες ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας ξεκινώντας από το στάδιο των 3-4 πραγματικών φύλλων σε δοσολογία 3-10 lt/στρ
Βαμβάκι	Διαφυλλικά: Στην ανθοφορία και στη συνέχεια κάθε 1-2 εβδομάδες μόνο του ή μαζί με άλλα διαφυλλικά λιπάσματα σε δοσολογία 0,5-1,0 lt/στρ αραιωμένο σε αναλογία 1:50-100
Καλαμπόκι	Διαφυλλικά: Πριν το σχηματισμό του θυσάνου και 7-10 ημέρες αργότερα σε δοσολογία 0,5-1,0 lt/στρ αραιωμένο σε αναλογία 1:50-100
Τριφύλλι, Αλφάλφα	Διαφυλλικά: Μετά από κάθε κόψιμο σε δοσολογία 0,5-1,5 lt/στρ αραιωμένο σε αναλογία 1:50-100
Μπιζέλια, Φακές	Διαφυλλικά: Αργά στο μπουμπούκισμα ή στο 10% της ανθοφορίας σε δοσολογία 0,5-1,5 lt/στρ αραιωμένο σε αναλογία 1:50-100
Πατάτα	Διαφυλλικά: Κατά το σχηματισμό των κονδύλων, 2-3 εβδομάδες αργότερα και κατά τη διόγκωση των κονδύλων σε δοσολογία 1 lt/στρ αραιωμένο σε αναλογία 1:50-100
Δημητριακά	Διαφυλλικά: Στο βλάστημα σε δοσολογία 0,5-1,5 lt/στρ αραιωμένο σε αναλογία 1:30-80
Τομάτα	Διαφυλλικά: Στο δέσιμο και στη συνέχεια κάθε 2-3 εβδομάδες σε δοσολογία 0,5-1,5 lt/στρ αραιωμένο σε αναλογία 1:100-150