

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (β/β) - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οργανικό άζωτο (N) 3%, Οργανικός άνθρακας (C) 1.4%, Αμίνες-Αμινοξέα 20%, 2-φαινεθυλαμίνη 2.4 mg/lit, Σπερμίνη 3.6 mg/lit, pH: 7,8 Ηλεκτρική αγωγιμότητα: 60 ds/m Αλατότητα: 39,85 Ειδικό βάρος: 1,04

ΟΦΕΛΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ : Το **AminaL** είναι ένα υγρό οργανικό λίπασμα αζώτου το οποίο προέρχεται από τη θερμική επεξεργασία, υδρόλυση και απόσταξη κρεατάλευρων και ιχθυάλευρων χωρίς την προσθήκη χημικών. Η αποτελεσματικότητά του **AminaL** είναι άμεση και έγκειται στις αμίνες οι οποίες αφομοιώνονται άμεσα τόσο από τα φυτά όσο και από τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς της ριζόσφαιρας.

- ◆ Προσφέρει άμεσα αφομοιώσιμο άζωτο ενισχύοντας την ανάπτυξη των φυτών.
- ◆ Διεγείρει τη ριζοβολία και ιδιαίτερα τη δημιουργία παράπλευρων ριζών.
- ◆ Αυξάνει την περιεκτικότητα σακχάρων (brix) στους καρπούς.
- ◆ Συμβάλει στον πολλαπλασιασμό των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους που οδηγεί στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους.
- ◆ Επιταχύνει την ανάπτυξη της καλλιέργειας.
- ◆ Μειώνει το στρες που προκαλείται από ξηρασία και ανταγωνισμό με ζιζάνια.
- ◆ Αυξάνει την καρπόδεση προσελκύοντας έντομα-επικονιαστές που προωθούν την εντομόφιλη επικονίαση.
- ◆ Δεν περιέχει άλατα και δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ : Είναι επιβλαβές εάν καταποθεί. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Πλύνετε πολύ καλά κάθε εκτεθειμένο μέρος του σώματος με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή για τα μάτια. Χρησιμοποιήστε ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, φόρμα, γάντια κτλ.) κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ : Διατηρήστε το προϊόν καλά κλεισμένο στον περιέκτη. Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου ή σε δροσερό μέρος. **ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

Οργανικό λίπασμα και βελτιωτικό του εδάφους/ απαγορεύεται η πρόσβαση εκτρεφόμενων ζώων στην έκταση τουλάχιστον για 21 ημέρες μετά τη διασπορά του στο έδαφος. Παράγεται στην Ιταλία από την GRENA s.r.l. (Approval number APB58UFERT2).

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: Β'

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

AminaL

Υγρό Οργανικό Λίπασμα Αζώτου 3 - 0 - 0

Διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών με τη δύναμη των αμινών



Καθαρό
Περιεχόμενο
250 cc

bio
Κατάλληλο
για βιολογικές
καλλιέργειες

Αποκλειστική Διάθεση
HUMOFERT

Ερμού 1 & Θεοδοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Web Site: www.humofert.gr

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Το **AminaL** εφαρμόζεται με διαφυλλικό ψεκάσμο και ριζοπότισμα σε πολυάριθμες εφαρμογές καθόλη τη διάρκεια της παραγωγικής ζωής του φυτού.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όπωροφόρα : Διαφυλλικά: 40-60 ml (2-3 καπάκια)/5 lt νερό στη νέα ανάπτυξη. Υδρολίπανση: 80-100 ml (4-5 καπάκια)/10 lt νερό κάθε 7-10 ημέρες.

Εσπεριδοειδή : Διαφυλλικά: 40-60 ml (2-3 καπάκια)/5 lt νερό στη νέα ανάπτυξη. Υδρολίπανση: 80-100 ml (4-5 καπάκια)/10 lt νερό κάθε 15 ημέρες.

Ελιά : Διαφυλλικά: 40-60 ml (2-3 καπάκια)/5 lt νερό στη νέα ανάπτυξη. Υδρολίπανση: 100-120 ml (5-6 καπάκια)/10 lt νερό κάθε 15 ημέρες.

Αμπέλι : Διαφυλλικά: 40-60 ml (2-3 καπάκια)/5 lt νερό όταν εμφανιστούν 3-4 φύλλα ανά βλαστάρι. Υδρολίπανση: 80-100 ml (4-5 καπάκια)/10 lt νερό κάθε 7 ημέρες.

Λαχανικά-Κηπευτικά υπαίθρια : Διαφυλλικά: 20-40 ml (1-2 καπάκια)/5 lt νερό 7 ημέρες μετά τη φύτευση, στην εμφάνιση των πρώτων φύλλων, στην άνθηση και πριν τη συγκομιδή.

Υδρολίπανση: 40-60 ml (2-3 καπάκια)/10 lt νερό κάθε 7-10 ημέρες.

Λαχανικά-Κηπευτικά θερμοκηπίου : Διαφυλλικά: 20-40 ml (1-2 καπάκια)/5 lt νερό 7 ημέρες μετά τη φύτευση, στην εμφάνιση των πρώτων φύλλων, στην άνθηση και πριν τη συγκομιδή.

Υδρολίπανση: 60-80 ml (3-4 καπάκια)/10 lt νερό κάθε 7-10 ημέρες.

Καλλωπιστικά φυτά : Διαφυλλικά: 20-40 ml (1-2 καπάκια)/5 lt νερό μετά τη φύτευση, στην εμφάνιση νέων φύλλων και στην άνθηση. Υδρολίπανση: 60-80 ml (3-4 καπάκια)/10 lt νερό κάθε 10-15 ημέρες.

Γκαζόν : Διαφυλλικά: 20-40 ml (1-2 καπάκια)/5 lt νερό κάθε 15-20 ημέρες κατά την περίοδο έντονης ανάπτυξης και 1 φορά το μήνα τον υπόλοιπο καιρό. Υδρολίπανση: 40-60 ml (2-3 καπάκια)/10 lt νερό κάθε 7-10 ημέρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Η δοσολογία αραιώσεως για τους διαφυλλικούς ψεκασμούς δεν πρέπει να είναι πυκνότερη από 100 ml/5 lt νερό. Οι διαφυλλικές εφαρμογές να γίνονται τις δροσερές ώρες της ημέρας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα λιπάσματα και χημικά παρασκευάσματα. Όλες οι υδατοδιαλυτές σκόνες να αναμιγνύονται με το **AminaL** μετά από προδιάλυση. Ακολουθήστε τις οδηγίες των παρασκευαστών φυτοφαρμάκων πριν τα αναμίξετε με το **AminaL**. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βυτίο.