

Το **BIOFERTIN-L 7-0-0** είναι ένα υγρό οργανικό λίπασμα που παρασκευάζεται από την ήπια ενζυματική υδρόλυση φυσικών πρωτεϊνών. Αυτή η παραγωγική διαδικασία εγγυάται τη διατήρηση των απαραίτητων αμινοξέων καθώς και ένα υψηλό ποσοστό οργανικού αζώτου (>7%) προερχόμενου μόνο από τα αμινοξέα. Το **BIOFERTIN-L 7-0-0** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες ως οργανικό λίπασμα αζώτου, ως προσκολλητικό/διαβρέχτης και ως βιοδιεγέρτης ανάπτυξης και ανάκαμψης μετά από περιόδους έντονου στρες (παγετός, καύσωνας).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αυξάνει την ανάπτυξη των φυτών.
- Παρέχει άζωτο άμεσα διαθέσιμο στα φυτά.
- Ενισχύει την ανθεκτικότητα των φυτών στο στρες.
- Προάγει την ανάπτυξη των καρπών.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα λιπάσματα και χημικά παρασκευάσματα. Όλες οι υδατοδιαλυτές σκόνες να αναμιγνύονται με το **BIOFERTIN-L 7-0-0** μετά από προδιάλυση. Ακολουθήστε τις οδηγίες των παρασκευαστών φυτοφαρμάκων πριν τα αναμίξετε με το **BIOFERTIN-L 7-0-0**. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την τελική ανάμιξη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Είναι επιβλαβές εάν καταπίνεται. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια γιατί προκαλεί ερεθισμό και πιθανή βλάβη. Πλύνετε πολύ καλά κάθε εκτεθειμένο μέρος του σώματος με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή για τα μάτια. Χρησιμοποιείστε ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, φόρμα, γάντια κτλ.) κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Biofertin-L

7 - 0 - 0

ΥΓΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

για διαφυλλικούς ψεκασμούς και υδρολίπανσεις σε όλες τις καλλιέργειες

ΣΥΝΘΕΣΗ	(% β/β)	(% β/ο)
Αζωτο (N)	7,0	8,0
Αμινοξέα	43,0	50,0
Χλώριο (Cl)	< 1,0	< 1,2
pH		5,5-6,5
Αγωγιμότητα (ds/m)		9,5
Αλατότητα (ppt)		5,5

bio
Κατάλληλο
για βιολογικές
καλλιέργειες

Αποκλειστική Διάθεση

HUMOFERT

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου
144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891
Web Site: www.humofert.gr



Καθ. Περιεχόμενο
250cc

Ομάδα λιπασμάτων
νέου τύπου: **B'**
Αρ. κυκλοφορίας:

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Διαφυλλικός ψεκασμός: 10-15 ml (1 καπάκι) αραιωμένο σε 1-4 λίτρα νερό
Υδρολίπανση (πότισμα): 20-75 ml (2-5 καπάκια) ανά 5 λίτρα νερό
Προσκολλητική δράση: 3-5 ml ανά λίτρο νερό

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Φράουλες: Κάθε 10-15 ημέρες από την έναρξη της ανάπτυξης.

Κηπευτικά: Κάθε 7-12 ημέρες από τη μεταφύτευση.

Λαχανικά: Κάθε 7-10 ημέρες μετά την εμφάνιση των πρώτων πραγματικών φύλλων.

Πατάτα: Κάθε 10-14 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο σχηματισμού του κονδύλου έως την έναρξη της άνθησης.

Δέντρα (εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιές, κ.α.): Κάθε 10-15 ημέρες ξεκινώντας από το στάδιο πριν την ανθοφορία έως την αρχή της ωρίμανσης.

Αμπέλι, Ακτινίδιο: Κάθε 10-15 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο πριν την ανθοφορία έως την αρχή της ωρίμανσης.

Καλλωπιστικά φυτά, Δασικά δενδρύλλια: Κάθε 7-12 ημέρες.

Λουλούδια: Κάθε 8-12 ημέρες.

Γκαζόν, Αστικό πράσινο: Κάθε 10-15 ημέρες.

Δημητριακά: Στο στάδιο των 10-20 εκατοστών.

Καλαμπόκι: Στο στάδιο των 15-20 εκατοστών, στο στάδιο των 25-35 εκατοστών και πριν το σχηματισμό του θυσάνου.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διατηρήστε το προϊόν καλά κλεισμένο στον περιέκτη. Το προϊόν δε θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μεταλλικά δοχεία. Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου ή σε δροσερό μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να εφαρμόζεται τις δροσερές ώρες της ημέρας.