

Υδατοδιαλυτό κρυσταλλικό λίπασμα με ιχνοστοιχεία

CF-55

Crystal Fertilizer **NPK 15-10-29+1MgO**

για ωρίμανση



| | |
|---|---------|
| Αζωτο (N) | 15,0 % |
| Νιτρικό N | 1,4 % |
| Αμμωνιακό N | 3,0 % |
| Ουρικό N | 10,6 % |
| Φώσφορος (P ₂ O ₅) | 10,0 % |
| Κάλιο (K ₂ O) | 29,0 % |
| Μαγνήσιο (MgO) | 1,0 % |
| Σίδηρος (Fe) | 250 ppm |
| Ψευδάργυρος (Zn) | 125 ppm |
| Μαγγάνιο (Mn) | 125 ppm |
| Χαλκός (Cu) | 125 ppm |
| Βόριο (B) | 50 ppm |
| Μολυβδαίνιο (Mo) | 5 ppm |

Κάθ. βάρος

400 g

Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Διαφυλλική Εφαρμογή: 15-30 γρ. (2-3 κουταλιές του γλυκού) ανά 10 λίτρα νερό. Ριζόποτισμα: 20-40 γρ. (2-4 κουταλιές του γλυκού) ανά 10 λίτρα νερό. **Εδαφική Εφαρμογή:** Σκορπίζουμε περιμετρικά από το βλαστό ή τον κορμό και κατόπιν ποτίζουμε (Μικρές γλάστρες: 7-10 γρ. ή 1 κουτάλι του γλυκού, Μεγάλες γλάστρες: 16-20 γρ. ή 2 κουταλιές του γλυκού, Θάμνοι-Κηπευτικά-Καλλωπιστικά στο έδαφος: 30-40 γρ. ή 3-4 κουταλιές του γλυκού, Δέντρα-Αμπέλια: 40-60 γρ. ή 4-6 κουταλιές του γλυκού).

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Εφαρμόζουμε κάθε 10-15 ημέρες από Άνοιξη έως Φθινόπωρο. Οι διαφυλλικές εφαρμογές πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια παγετού ή καύσινα. Το καλοκαίρι να αποφεύγονται οι διαφυλλικοί ψεκασμοί τις θερμές ώρες της ημέρας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Ζητήστε συμβουλή γεωπόνου πριν αναμίξετε με οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά τη χρήση. Διατηρήστε το μακριά από παιδιά και υψηλές θερμοκρασίες. Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777.

Παράγεται από την

HUMOFERT



www.humofert.gr