

Multi-Mix

Τυπική Ανάλυση

Σίδηρος (Fe)	5,5 %	Βόριο (B)	1,8 %
Ψευδάργυρος (Zn)	3,0 %	Χαλκός (Cu)	0,5 %
Μαγγάνιο (Mn)	2,0 %	Μολυβδαίνιο (Mo)	0,006 %
Μαγνήσιο (MgO)	3,0 %	Θείο (S)	2,5 %

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαφυλλική εφαρμογή: Η διαφυλλική εφαρμογή συστήνεται για γρήγορη διόρθωση τροφοπενιών. Σε περίπτωση που εμφανιστεί φυτοτοξικότητα όπως εγκαύματα σε πολύ ευαίσθητες καλλιέργειες μετά από διαφυλλική εφαρμογή, συνεχίστε με εδαφική εφαρμογή. Για να επιτύχουμε μέγιστα οφέλη, οι διαφυλλικές εφαρμογές πρέπει να ξεκινούν στις αρχές της καλλιέργητης περιόδου, μολις υπάρξει ικανοποιητική φυλλωσιά για να απορροφήσει το σπρέι. Σε περίπτωση έντονων τροφοπενιών οι εφαρμογές πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 7-14 ημέρες. Όταν εφαρμόζεται διαφυλλικά μόνο του, συστήνεται η πρόσθιση στο διάλυμα προσκολλητικού.

Εδαφική εφαρμογή: Διαλύστε σε κατάλληλη ποσότητα νερού, και εφαρμόστε με ωκεαστήρα χαμηλής πίεσης ή μαζί με κάπιο υγρό λίπασμα. Εφαρμόστε στο έδαφος κοντά στα φυτά και στους κορμούς των δέντρων. Για αύξηση της λήψης των θερεπικών στοιχείων σκαλίστε και ποτίστε προσεχτικά μετά από κάθε εφαρμογή.

Δέντρα & Θάμνοι με βαθύ ριζικό σύστημα: Εφαρμόζουμε κυκλικά γύρω από τον κορμό μέσα στο όριο του φάσματος των κλαδίων πριν την έναρξη της εποικικής ανάπτυξης. **Καλλιέργειες με επιφανειακό ριζικό σύστημα:** Εφαρμόζουμε γραμμικά με τα πρώτα σημάδια της εποικικής ανάπτυξης. Σε συμπαγή εδάφη συστήνεται φρεάτισμα πριν την εφαρμογή.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μπορεί να αναμιχθεί με τα περισσότερα λιπάσματα και αγροχημικά προϊόντα χωρίς να δημιουργείται ίζημα ή πρόβλημα εγκαύματων. Όταν συνδύαζεται με υγρά λιπάσματα το διάλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται το συντομότερο δυνατό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του σε ξηρό μέρος, μακριά από έντονο φως. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Λίπασμα Ε.Κ.

Καθ. βάρος : 1 Kg 5 Kg 25 Kg

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Μεταμόρφωση
www.humofert.gr

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Οι δοσολογίες εξαρτώνται από το είδος και το μέγεθος του φυτού, τον τύπο του εδάφους καθώς και το βαθμό της τροφοπενίας.

Διαφυλλική εφαρμογή

Λαχανικά : 100 - 400 γρ./στρέμμα.

Δημητριακά : 100 - 200 γρ./στρέμμα.

Οπωροφόρα δέντρα & θάμνοι : 200 - 500 γρ./στρέμμα σε πρόγραμμα επαναλαμβανόμενων ενισχυμένων φεκασμών (π.χ. 4 εφαρμογές των 50 γρ. σε 30 - 100 λίτρα νερό/στρέμμα).

Καλλωπιστικά : 100 - 400 γρ./στρέμμα

Σημείωση : Οι δοσολογίες δεν πρέπει να ξεπερνούν ποτέ τα 2 γρ./λίτρο νερό.

Εδαφική εφαρμογή

Λαχανικά : 0,4 - 0,8 κιλά/στρέμμα.

Δημητριακά : 0,4 - 1 κιλό/στρέμμα.

Οπωροφόρα δέντρα & θάμνοι : 0,4 - 1 κιλό/στρέμμα

Καλλωπιστικά : 0,2 - 1 κιλό/στρέμμα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από στρες όπως υπερβολικές θερμοκρασίες, έντονους ανέμους κλπ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Τοξικό για την αναπαραγωγή (κατηγορία 1B)

Δηλώσεις Επικινδυνότητας :

H360FD: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης (Disodium Octaborate Tetrahydrate)

Δηλώσεις Προφύλαξης :

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P281: Χρησιμοποιείτε μέσα απομικής προστασίας όπως απαγείτε. P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πθωμάτων έκθεσης: Συμβουλεύετε/επισκεφτείτε γιατρό. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε... σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (θα προσδιοριστεί).