

Bactilis-S

Ωφέλιμα βακτήρια εδάφους: $7,5 \times 10^8$ cfu*/g

(*cfu: μονάδες σχηματιζόμενων αποικιών)

Το **Bactilis-S** είναι ένα μικροβιακό σκεύασμα που περιέχει ωφέλιμους μικροοργανισμούς εδάφους σε μορφή σπορίων. Μόλις το **Bactilis-S** εφαρμοστεί στο έδαφος τα σπόρια εποικίζουν γρήγορα στις ρίζες των φυτών και αρχίζουν να παράγουν ένζυμα και προϊόντα μεταβολισμού παρόμοια με τις αυξίνες, τα οποία βελτιώνουν τη ριζοβολία, την ανάπτυξη και το σφρίγος των φυτών και βελτιώνουν την ανθεκτικότητα του ριζικού συστήματος σε συνθήκες καταπόνησης.

Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί που λειτουργούν συμβιωτικά με τις ρίζες δημιουργούν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης γύρω από τη ριζόσφαιρα και παράλληλα περιορίζουν τις εισόδους πρόσβασης άλλων μικροοργανισμών (κυρίως μυκήτων του εδάφους) στο ριζικό σύστημα. Το **Bactilis-S** χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των βιολογικών διεργασιών των κηπευτικών, του γκαζόν, των καλλωπιστικών, των βοτάνων και των δέντρων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Διεγέρει και προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.
- Βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας των φυτών.
- Ενισχύει το σφρίγος των φυτών.
- Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών στο στρες που προκαλείται από ποικίλους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του εδάφους.
- Προωθεί την ανάπτυξη των καλλιεργειών.
- Βελτιώνει τις εδαφικές συνθήκες για ανάπτυξη παραγωγικών και υγειών φυτών.
- Αυξάνει την ικανότητα πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων από τις ρίζες των φυτών.



Παράγεται από την

HUMOFERT

Καθ. βάρος
20 g



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891, www.humofert.gr



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το **Bactilis-S** συστήνεται για εδαφικές εφαρμογές μέσω του συστήματος λίπανσης - άρδευσης αφού πρώτα διαλυθεί σε κατάλληλο διάλυμα ανάπτυξης βακτηρίων **BACTA-FOOD** για ενεργοποίηση του μικροβιακού πληθυσμού. **Εφαρμόστε όλο το περιεχόμενο του φακέλου σε μία δόση.**

Οδηγία: Διαλύουμε 20g **Bactilis-S** σε 1 λίτρο υγρού διαλύματος ανάπτυξης βακτηρίων **BACTA-FOOD** και το αφήνουμε για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου 20 - 25 °C αναδεύοντας κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε το διάλυμα στη δεξαμενή εφαρμογής και ποτίζουμε.

Σημείωση: Επειδή η σκόνη ενδέχεται να έχει κολλήσει στα τοιχώματα του φακέλου, το άδειασμα του περιεχομένου πρέπει να γίνει με επιμέλεια ώστε να χρησιμοποιηθεί όλο το μικροβιακό φορτίο του προϊόντος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ:

Οσπρια, Φυλλώδη Λαχανικά, Σέλινο, Κρεμμύδια, Βότανα, Αρωματικά φυτά: 5-10 g/στρέμμα. Εφαρμογή κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση.

Τομάτες, Πιπεριές, Καρποδετικά Λαχανικά : 5-10 g/στρέμμα. Εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση. Επανάληψη κάθε 14-28 ημέρες.

Πεπόνια, Αγγούρια & άλλα κολοκυνθοειδή : 5-10 g/στρέμμα. Εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση. Επανάληψη κάθε 14-28 ημέρες.

Φράουλα : 5-10 g/στρέμμα. Εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση. Επανάληψη κάθε 14-28 ημέρες.

Δέντρα, Αμπέλι : 10-20 g/στρέμμα 2-3 φορές το χρόνο με πότισμα γύρω από τη ριζόσφαιρα. Για νέες φυτεύσεις εφαρμόζουμε 20 g/στρέμμα αμέσως μετά τη μεταφύτευση.

Σπορεία, Φυτώρια : 20 g/500-1000 L νερό. Εφαρμόζουμε με το νερό του ποτίσματος. Επαναλαμβάνουμε κάθε 15 ημέρες.

Δενδρύλλια, Θάμνοι, Αναρριχητικά φυτά : 10 g/100 L νερό. Εφαρμόζουμε κατά τη μεταφύτευση. Επαναλαμβάνουμε κάθε 15-30 ημέρες.

Γκαζόν : 20 g/στρέμμα. Επαναλαμβάνομενο ψεκασμοί κάθε 3-4 εβδομάδες.

Υδροπονία : 10 g/1000 L νερό με διάχυση μέσω του συστήματος. Αναπλήρωση 5 g/1000 L νερό κάθε φορά που προστίθεται νερό στο δίκτυο.

Καλλωπιστικά φυτά : 20 g/100 L νερό. Εφαρμόζουμε κατά τη μεταφύτευση. Επαναλαμβάνουμε κάθε 15-20 ημέρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το **Bactilis-S** μπορεί να συνδυαστεί με λιπάσματα, μικητοκτόνα και άλλα χημικά σκευάσματα. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες ανάμιξης που αναγράφονται στις επικέτες των υπολοίπων χημικών σκευασμάτων. Εφαρμόστε όλο το διάλυμα της δεξαμενής την ίδια μέρα. ΔΕΝ συνδυάζεται με βακτηριοκτόνα και απολύμαντικά εδάφους. Το **Bactilis-S** εφαρμόζεται μετά την απολύμανση του εδάφους. Εφαρμόστε 48 ώρες μετά την εφαρμογή κάποιου βακτηριοκτόνου ή σκευάσματος απολύμανσης εδάφους. ΔΕΝ συνδυάζεται με προϊόντα που περιέχουν οποιοδήποτε τύπο υπεροξειδίου. Εφαρμόστε το **Bactilis-S** 24 ώρες μετά την εφαρμογή τέτοιων σκευασμάτων. Το **Bactilis-S** δεν είναι φυτοτοξικό στα φυτά.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε συνθήκες δωματίου. Κρατείστε το μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία καθώς και οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Τα άδεια φάκελα δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

Διατηρείστε το μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Αν πέσει στο δέρμα ή στα ρούχα πλύνετε καλά το δέρμα σας με σαπούνι και νερό. Αν πέσει στα μάτια ξεπλυσθείτε με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός παραμείνει ζητήστε ιατρική βοήθεια.