

# Βόριο σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης

Για τη διόρθωση της τροφοπενίας Βορίου σε όλες τις καλλιέργειες

# Elem-B

Λίπασμα Ε.Κ.

Περιέχει  
21% Βόριο

bio  
Κατάλληλο  
για βιολογικές  
καλλιέργειες

Το Elem-B χρησιμοποιείται για τη διόρθωση της τροφοπενίας Βορίου σε όλες τις καλλιέργειες. Περιέχει 21% Β σε μορφή Βορικού Νατρίου (67,8% B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 14,6% Na<sub>2</sub>O) και συστήνεται για διαφυλλικές και εδαφικές εφαρμογές.

## ΑΝΑΜΙΞΗ

Προετοιμάστε ένα συμπυκνωμένο διάλυμα Βορίου και προσθέστε το στη δεξαμενή. Ανακατέψτε καλά και εφαρμόστε το μίγμα το συντομότερο δυνατό.

## ΔΟΣΟΛΟΓΙΣ

Εδαφική Εφαρμογή:  
Εφαρμόζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες Βορίου της καλλιέργειας.

### α) Μεγάλη ανάγκη Βορίου

(Τεύτλα, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Σέλινο, Μηδική, Τριφύλλι, Ηλιοτρόπιο, Αμύγδαλο, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Μήλο, Καρύδι, Ελιά, Αμπέλι): 0,5-1,2 κιλά/στρέμμα

**β) Μέτρια ανάγκη Βορίου** (Τομάτα, Μελιτζάνα, Κολοκύθι, Μαρούλι, Σπανάκι, Καρότο, Κρεμμύδι, Γλυκό Καλαμπόκι, Βαμβάκι, Καπνός, Σπαράγγι, Αχλάδι, Ροδάκινο, Κεράσι): 250-500 γρ./στρέμμα

**γ) Μικρή ανάγκη Βορίου** (Πατάτα, Πιπεριά, Πεπόνι, Μπιζέλι, Φράουλα, Εσπεριδοειδή, Καλαμπόκι, Δημητριακά, Γκαζόν, Σόγια, Σόργο): 100-200 γρ./στρέμμα

Διαφυλλική Εφαρμογή: Εφαρμόζουμε όταν η καλλιέργεια έχει αναπτύξει αρκετό φύλλωμα ώστε να μπορεί να απορροφήσει το σπρέι. Όπου είναι εφικτό, πρέπει να χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς πολλές από τις ευαίσθητες καλλιέργειες έχουν κηρώδη φύλλα που είναι δύσκολο να διαβρεχθούν.

Τεύτλα: 250- 500 γρ./50 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Λαχανικά: 100-500 γρ./200-500 λίτρα νερό. Ελιά: 500 γρ./500 λίτρα νερό. Μήλα, Αχλάδια: Κάνουμε 3 εφαρμογές σε διαστήματα 14-21 ημερών η μία από την άλλη με δοσολογία 200 γρ./80-100 λίτρα νερό ανά στρέμμα.

Σημείωση: Μην εφαρμόζετε ποτέ περισσότερο από 1 κιλό ανά στρέμμα με μία μόνο εφαρμογή. Εάν η καλλιέργεια έχει μεγαλύτερη ανάγκη Βορίου διαιρέστε τη συνολική δοσολογία σε δόσεις και εφαρμόστε περισσότερες φορές ανά διάστημα 14 ημερών.

## ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα περισσότερα μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και υγρά λίπασματα. Ένα τεστ συνδυαστικότητας είναι καλό να γίνεται πάντοτε πριν την ανάμιξη στη δεξαμενή.

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να μην εφαρμόζετε όταν το φως του ήλιου είναι έντονο και η θερμοκρασία μεγαλύτερη από 24°C. Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Προστατέψτε το από την παγωιά.



Διατίθεται από την

**HUMOFERT**



Ερμού 1 & Θεοδοπούλου  
144 52 Μεταμόρφωση  
Τηλ. 210 284 5891  
E-mail: info@humofert.gr  
Web Site: www.humofert.gr

ET.001.022 - Ver. 21.2 GR0721

## ΚΙΝΔΥΝΟΣ



### Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H360FD: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

### Δηλώσεις Προφύλαξης:

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται. P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε/ επισκεφτείτε γιατρό. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P 5 0 1 : Δ ι ά θ ε σ η τ ο υ περιεχομένου/περιέκτη σε... σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (θα προσδιορισθεί). **Περιέχει:** Disodium Octaborate Tetrahydrate

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ