

Το **Dry-Hum** είναι ένας 100% υδατοδιαλυτός στερεός ενεργοποιητής εδάφους προερχόμενος από λεοναρδίτη. Περιέχει πάνω από 95% Χουμικό Κάλιο και Ιχνοστοιχεία σε ελάχιστες ποσότητες. Επίσης περιέχει φαινόλες και άλλες καρβοξυλικές ενώσεις που δρουν όπως ακριβώς οι κυτοκινίνες και οι αυξίνες στη διέγερση του κυττάρου.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αποδεσμεύει και ενεργοποιεί τα θρεπτικά στοιχεία κάνοντάς τα άμεσα αφομοιώσιμα στα φυτά.
- Διεγείρει την ανάπτυξη του φυτού.
- Δημιουργεί πλούσιο ριζικό σύστημα στο φυτό.
- Αυξάνει την αντοχή των φυτών στο στρες της παγωνιάς, της ξηρασίας και της μεταφύτευσης.
- Αυξάνει το μέγεθος και τον αριθμό των λουλουδιών βελτιώνοντας συγχρόνως το χρωματισμό τους.
- Βελτιώνει την ποιότητα και την γεύση των καρπών και των λαχανικών.
- Αυξάνει την αντοχή των καρπών στις μεταφορές και επιμηκύνει το χρόνο αποθήκευσής τους.
- Βοηθά στην εναλλαγή των εδαφικών ιόντων.
- Προσδίδει στο έδαφος σπογγώδη υφή και σε συνεκτικά εδάφη καλύτερο αερισμό.
- Βελτιώνει τη δομή στα αμμώδη εδάφη μειώνοντας την έκπλυση των θρεπτικών στοιχείων και αυξάνοντας την ικανότητα συγκράτησης του νερού.
- Διεγείρει την ανάπτυξη της φυσικής μικροχλωρίδας του εδάφους.
- Αυξάνει τη δράση των αποφυλλωτικών και των ζιζανιοκτόνων.
- Δεν είναι φυτοτοξικό.

100% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΟΥΜΙΚΟ ΟΞΥ

Dry-Hum



Περιέχει
95 % Χουμικό Κάλιο

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
T: 210 284 5891 - F: 210 281 7971
@: info@humofert.gr W: www.humofert.gr

Καθ. Περιεχόμενο

500 g

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαφυλλική λίπανση: 25-50 g/100 L νερό

Υδρολίπανση: 150-250 g/στρέμμα

Σπορεία: 50-75 g/100 L νερό

Εμβάπτιση σπόρων: 100-150 g/100 L νερό (καλό μούλιασμα του σπόρου για 24 ώρες, αφήνουμε το σπόρο να στεγνώσει καλά).

Εμβάπτιση ριζών κατά τη μεταφύτευση: Σε διάλυμα 100-150 g/100 L νερό.

ΧΡΗΣΗ : Κάνουμε προδιάλυση της σκόνης σε λίγο νερό και ρίχνουμε το διάλυμα στο βυτίο.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λαχανικά - Κηπευτικά - Άνηθ : Για αυτά που μεταφυτεύονται εμβάπτιση των σπόρων πριν τη σπορά και πότισμα με αραιό διάλυμα μετά τη μεταφύτευση. Στη συνέχεια ξεκινάμε τις εφαρμογές από το στάδιο των 4-6 φύλλων και συνεχίζουμε κάθε 10-15 ημέρες έως το τέλος της καλλιέργειας.

Δέντρα - Αμπέλια : Στην αρχή της βλάστησης, μετά την πτώση των πετάλων και κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης έως 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

Βαμβάκι : 3-4 εφαρμογές μετά την έκπτυξη των πρώτων φύλλων.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα περισσότερα ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και προιόντα διαφυλλικής λίπανσης. Δεν συνδυάζεται με ζιζανιοκτόνα επαφής και ελαιούχα ή πολύ όξινα σκευάσματα. Ένα τεστ συνδυαστικότητας συστήνεται πριν την ανάμιξη στο βυτίο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος μακριά από παγωνιά, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο φως. Διατηρήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

