

Το Proton-C είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό οργανικό λίπασμα, το οποίο προέρχεται από θαλάσσια φύκια του γένους *Ascophyllum nodosum*. Λόγω του τρόπου παραγωγής του το Proton-C διατηρεί όλο το θρεπτικό περιεχόμενο των φυκιών, το οποίο περιλαμβάνει φυσικές φυτορυμόνες (κυτοκινίνες, αυξίνες, γιββερελλίνες, μπεταΐνες), αμινοξέα και υδατάνθρακες. Εφαρμόζοντας το Proton-C επιτυγχάνουμε:

- Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των καλλιεργειών.
- Αύξηση της ανθοφορίας και της καρπόδεσης.
- Προώθηση της ανάπτυξης.
- Βελτίωση της ποιότητας της συγκομιδής (αύξηση σακχάρων, ίχνοστοιχείων).
- Επιμήκυνση του χρόνου ζωής των νωπών καρπών στο ράφι (shelf life).
- Ενίσχυση του ριζικού συστήματος των φυτών.
- Μεγαλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τις ρίζες και τα φύλλα.
- Αύξηση του πληθυσμού των αφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους.
- Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυτών σε βιοτικούς παράγοντες.
- Μεγαλύτερη αντοχή σε στρες προερχόμενο από περιβαλλοντικούς παράγοντες (παγετό και ξηρασία).
- Υψηλότερη φυτωριακότητα των σπόρων.
- Αύξηση των κερδών του καλλιεργητή.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Διαφυλλικά: 250-500 ml / 200 lt νερό ή 0,5-1 καπάκι / 10 lt νερό

Υδρολίπανση: 0,5-1 lt / στρέμμα ή 1-2 καπάκια / 10 lt νερό

Εμβάπτιση σπόρων: 250 ml / 50 lt νερό (Αφήστε το σπόρο να στεγνώσει καλά)

Φυτώρια: 250 ml / 100 lt νερό

Εμβάπτιση ριζών: 250 ml / 50 lt νερό κατά τη μεταφύτευση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα τα λιπάσματα και θρεπτικά στοιχεία καθώς και με τα περισσότερα ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Δεν συνδυάζεται με πολύ όξινα και ελαιούχα σκευάσματα. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, καλό είναι να προηγείται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βιτό.

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: ΣΤ' Αρ. κυκλ. νέου τύπου λιπασμάτος: 24
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Proton-C

NPK 0,2-0,2-4,5

Συμπυκνωμένο Υγρό Οργανικό Λίπασμα από εκχύλισμα φυκιών θαλάσσης



Κατάλληλο για βιολογικές καλλιέργειες

Καθαρό Περιεχόμενο
250 cc



Αποκλειστική Διάθεση



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Web Site: www.humofert.gr

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δέντρα: Εφαρμόζουμε πριν την άνθηση, μετά την άνθηση και κατά τη διάρκεια της αρίμανσης έως 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Μια εφαρμογή μετά τη συγκομιδή αυξάνει την απόδοση του δέντρου την επόμενη χρονιά.

Ακτινίδια: Εφαρμόζουμε 3-4 φορές από τη δημιουργία καρπού ως τη συγκομιδή.

Αμπέλι: Εφαρμόζουμε στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης, του δεσμάτων καρπού και της μεγέθυνσης τσαμπιού και καρπού. Μια εφαρμογή μετά τη συγκομιδή αυξάνει την παραγωγικότητα του αμπελιού για την επόμενη χρονιά.

Φράουλα: Εφαρμόζουμε αρχικά όταν υπάρχει αρχική φυλλωσιά για να απορροφήσει το φέκασμα, στην πρώτη ανθοφορία, στο δέσιμο των καρπών και κάθε 2-3 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.

Φυλλώδη λαχανικά: Εφαρμόζουμε 3-4 φορές από το στάδιο των πρώτων πραγματικών φύλλων ως τη συγκομιδή.

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτάνα, Κολοκύθη, Πεπόνι: Εφαρμόζουμε σε ανάπτυξη 15-20 εκ., στην πρώτη ανθοφορία, στο πρώτο δέσιμο καρπού, 10-14 ημέρες αργότερα και 48 ώρες μετά από κάθε συγκομιδή.

Αγγούρι, Φασόλι: Εφαρμόζουμε στα πρώτα 4 πραγματικά φύλλα, στην πρώτη ανθοφορία, 1-2 εβδομάδες αργότερα και 48 ώρες μετά από κάθε μάζεμα.

Πατάτα: Αρχικά κάνουμε εμβάπτιση των κονδύλων για 24 ώρες και στη συνέχεια εφαρμόζουμε σε ανάπτυξη 15-20 εκ., πριν την ανθοφορία και κατά την ανθοφορία.

Καλλωπιστικά φυτά, Ανθη: Κάθε 10-15 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης.

Καπνός, Τεύτλα: 3-4 εφαρμογές κάθε 10-20 μέρες αρχίζοντας από το στάδιο των πρώτων φύλλων.

Γρασίδια, Χορτονομές, Γκαζόν: Μετά από κάθε κόψιμο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αποφύγετε την κατάποση και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, πλύνετε πολύ καλά με άφθονο νερό. Αν ο ερεθισμός επιμείνει ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό μέρος μακριά από άμεση επαφή με το φως του ήλιου. Διατηρήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, καλά κλεισμένο στον περιέκτη.