

Το Fish-fert είναι ένα υγρό οργανικό λίπασμα που προέρχεται από την κρύα ενζυματική υδρόλυση φρέσκων ψαριών. Λόγω της ειδικής αυτής επεξεργασίας, το Fish-fert διατηρεί όλες τις Βιταμίνες, τα Αμινοξέα, τις Ένζυμα, τις Πρωτεΐνες, τα Έλαια και τις Αναπτυξιακές ορμόνες που προϋπάρχουν στο ψάρι. Επιπλέον το Fish-fert περιέχει πολλά μάκρο και μίκρο θρεπτικά στοιχεία σε χηλική μορφή.

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Αζωτο (N) 2,00 %, Φώσφορος (P_2O_5) 4,00 %, Κάλιο (K_2O) 0,20 %, Ασβέστιο (CaO) 0,60 %, Μαγνήσιο (MgO) 0,09 %, Θείο (S) 0,10 %, Σιδηρος (Fe) 26,0 ppm, Μαγγάνιο (Mn) 3,0 ppm, Χαλκός (Cu) 1,0 ppm, Ψευδάργυρος (Zn) 13,0 ppm, Μολυβδανίο (Mo) 1,0 ppm.
Επίσης περιέχει 18 Αμινοξέα σε ποσοστό 55% του άνυδρου προϊόντος.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αυξάνει την ανθοφορία και την καρπόδεση.
- Αυξάνει το μέγεθος και βελτιώνει την ποιότητα των καρπών.
- Βοηθά στο σχηματισμό σακχάρων μέσα στο φυτό, αυξάνοντας την ανθεκτικότητά του σε συνθήκες βιοτικού και περιβαλλοντικού στρες.
- Βοηθά την ανάπτυξη των αφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους που βελτιώνουν τη δομή του.
- Όλα τα θρεπτικά στοιχεία του είναι σε χηλική μορφή με αποτέλεσμα να είναι άμεσα διαθέσιμα στα φυτά και να μένουν περισσότερο στο έδαφος.
- Δεν δεσμεύει τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους.
- Μειώνει το κόστος λίπανσης και τους ψεκασμούς φυτοφαρμάκων.
- Δεν είναι φυτοτοξικό και δεν μολύνει το περιβάλλον.

ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Οργανικό λίπασμα και βελτιωτικό του εδάφους/ απαγορεύεται η πρόσβαση εκτρεφομένων ζώων στην έκταση τουλάχιστον για 21 ημέρες μετά τη διασπορά του στο έδαφος.

Υγρό Οργανικό Λίπασμα

Fish-fert

2 - 4 - 0,2



Κατάλληλο
για βιολογικές
καλλιέργειες

Παραγωγή-Διάθεση

HUMOFERT

Eρμού 1 & Θεοτοκοπούλου

144 52 Μεταμόρφωση

Τηλ. 210 284 5891

Web Site: www.humofert.gr



ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

Αρ. κυκλοφορίας: 22

Καθ. Περιεχόμενο

250 ml

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαφυλλική λίπανση : 500-1000 ml/100 lt νερό. Υδρολίπανση : 2-6 lt/στρέμμα. Εμβάπτιση σπόρων : 1-2 lt/100 lt νερό (Αφήνουμε το σπόρο να μουλιάσει καλά για 24 ώρες). Εμβάπτιση ριζών : 1-2 lt/100 lt νερό κατά τη μεταφύτευση.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λαχανικά - Κηπευτικά - Γλυκό καλαμπόκι: Κατά τη φύτευση - Κατά την εμφάνιση των πρώτων φύλλων ή για το γλυκό καλαμπόκι όταν τα φυτά φθάσουν σε ύψος 20-25 cm - Πριν την ανθοφορία ή πριν το σχηματισμό του θυσάνου για το γλυκό καλαμπόκι - Πριν τη συγκομιδή.

Δημητριακά-Βαμβάκι-Καπνός-Φασόλια-Πατάτα: Κατά τη φύτευση - Κατά την εμφάνιση των πρώτων φύλλων για Βαμβάκι-Καπνό-Φασόλια-Πατάτα, όταν τα φυτά φθάσουν σε ύψος 10-13 cm για τα δημητριακά ή όταν τα φυτά φθάσουν σε ύψος 20-25 cm για το καλαμπόκι, - Πριν την ανθοφορία ή πριν το σχηματισμό του θυσάνου - Πριν τη συγκομιδή.

Δένδρα - Αμπέλια: Στην αρχή της ανθοφορίας - Μόλις δέσει ο καρπός - 40 ημέρες μετά την καρπόδεση - Μετά τη συγκομιδή.

Καλλωπιστικά φυτά: Εφαρμόζουμε κάθε δύο με τρεις εβδομάδες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : Συνδυάζεται με τα περισσότερα ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και προϊόντα διαφυλλικής λίπανσης. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βιτό.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ : Εφαρμόστε μέσα σε 24 ώρες από την αραίωση του προϊόντος. Εφαρμόστε απ' ευθείας στο βιτό. Να μην αποθηκεύεται μετά την αραίωσή του. Διατηρείστε το μακριά από παιδιά.



5212024500830