

**ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (β/β):** Θείο (S) 20% (pH: 7.9-8.0, Αγωγιμότητα: 547 mS/cm, Αλατότητα: 380 ppt)  
**ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:** Παρέχει το απαραίτητο στα φυτά Θείο καθόλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους - Ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών συμβάλλοντας στον μεταβολισμό του αζώτου - Θεραπεύει γρήγορα και αποτελεσματικά τις τροφοπενίες θείου - Αυξάνει την αντοχή των φυτών απέναντι σε δυσμενείς βιολογικούς παράγοντες - Ενισχύει το σχηματισμό της χλωροφύλλης με συνέπεια την αύξηση της παραγωγής υδατανθράκων από τα φυτά - Προάγει τις βιοχημικές αντιδράσεις που συντελούνται στο εσωτερικό των φυτικών κυττάρων καθώς συμβάλει στην παραγωγή αμινοξέων, πρωτεϊνών, ενζύμων και βιταμινών - Αυξάνει την παραγωγή ελαίων στους ελαιούχους καρπούς.

**ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:** Να εφαρμόζεται μόνο τις δροσερές ώρες της ημέρας. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται υπό συνθήκες στρες. Να μην εφαρμόζεται νωρίτερα από χρονικό διάστημα 1 μήνα όταν έχει προηγηθεί εφαρμογή με πολύ γιατί μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα. Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 30°C μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά. Υπό συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και έντονης ηλιοφάνειας μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς και βερικοκιάς. Αμέσως μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε πολύ καλά τους ψεκαστήρες και όλο τον μεταλλικό εξοπλισμό που έχει έρθει σε επαφή με το **SLUD**, επειδή το προϊόν προκαλεί διάβρωση στα μέταλλα.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και άμεση ακτινοβολία σε μέρος καλά αεριζόμενο, ξηρό και δροσερό που να μην επιτρέπει το σχηματισμό πάγου. Η συσκευασία θα πρέπει να κλείνεται ερμητικά σε περίπτωση που παραμείνει προϊόν στο δοχείο. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

## ΠΡΟΣΟΧΗ



Περιέχει Θείο

**Δηλώσεις Επικινδυνότητας :** H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
**Δηλώσεις Προφύλαξης :** P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό. P321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε ... σε αυτή την ετικέτα). P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

## Υγρό Λίπασμα Θείου

# SLUD

bio

Κατάλληλο  
για βιολογικές  
καλλιέργειες

Καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες  
Θείου (S) και αυξάνει την ευρωστία  
των φυτών

Παραγωγή-Διάθεση

**ΗΥΜΟΦΕΡΤ**



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου  
144 52 Μεταμόρφωση  
Web Site: [www.humofert.gr](http://www.humofert.gr)

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: A  
Αρ. κυκλοφορίας: 21

Καθ. Περιεχόμενο  
**250 ml**

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ  
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Το **SLUD** εφαρμόζεται διαφυλλικά αφού πρώτα αραιωθεί σε κατάλληλη ποσότητα νερού. **ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ-ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:** **Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι:** 100 ml ανά 10 lt νερό κάθε 10-15 ημέρες από τη φύτευση έως τη συγκομιδή. **Φράουλα, Πατάτα:** 50-200 ml ανά 10 lt νερό κάθε 10-15 ημέρες από τη φύτευση έως τη συγκομιδή. **Σπανάκι, Καρότο, Φασόλι, Μπιζέλι, Σέλινο, Ραδίκι:** 50-200 ml ανά 10 lt νερό κάθε 10-15 ημέρες από τη φύτευση έως τη συγκομιδή. **Μηλιά, Αχλαδιά:** 100-200 ml ανά 10 lt νερό στα ακόλουθα στάδια: α) πράσινη κορυφή, β) ρόδινη κορυφή, γ) πτώση πετάλων, δ) 20-25 ημέρες αργότερα. (σημ.: οι εφαρμογές γ-δ να γίνονται με τη χαμηλότερη δοσολογία). **Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά:** 100-150 ml ανά 10 lt νερό στα ακόλουθα στάδια: α) πτώση πετάλων, β) απόσπασση κάλυκα, γ) καρπίδιο, δ) 20-25 ημέρες αργότερα. (σημ.: Να μην εφαρμόζεται σε ώριμους καρπούς γιατί μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό). **Ελιά:** 100 ml ανά 10 λίτρα νερό στην έναρξη και στο τέλος της άνθησης. (σημ.: Η τελευταία εφαρμογή να γίνεται το αργότερο 3 μήνες πριν τη συγκομιδή).

**Αμπέλι:** 50-150 ml ανά 10 lt νερό στα ακόλουθα στάδια: α) Όταν οι βλαστοί αποκτήσουν το τρίτο φύλλο πριν εμφανιστούν τα άνθη, β) κατά την άνθηση, γ) Μετά την καρπόδεση, δ) κάθε 15 μέρες μέχρι το γυάλισμα των ραγών. (σημ.: Οι εφαρμογές β-δ να γίνονται με τη χαμηλότερη δοσολογία. Να μην εφαρμόζεται μετά το γυάλισμα γιατί μπορεί να προκαλέσει λεκέδες στις ράγες). **Αμυγδαλιά:** 100 ml ανά 10 lt νερό κάθε 25-30 ημέρες ξεκινώντας μετά την άνθηση. **Τριανταφυλλιά:** 100 ml ανά 10 lt νερό κάθε 10-15 ημέρες ξεκινώντας μόλις ο βλαστός φθάσει τα 10 cm μήκος.

**Παρατηρήσεις:** Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής 20-28°C. Όπου δεν αναφέρεται ρητά, η τελευταία εφαρμογή να γίνεται τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν τη συγκομιδή. **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Να μην συνδυάζεται με αλκαλικά και ελαιούχα σκευάσματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των παρασκευαστών φυτοφαρμάκων πριν τα αναμίξετε με το **SLUD**. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βυτίο.

